

AVIFAUNA INSUBRICA

Osservazioni ornitologiche di particolare interesse
effettuate in Provincia di Varese
nell' anno 2017

Roberto Aletti
Gruppo Insubrico di Ornitologia



Ghiandaia marina - 19/05/2017 Lonate Pozzolo (foto Luca Giussani)

- Indice generale

Introduzione	3
Fenologia provinciale	4
Frequenza osservazioni / livello di diffusione	5
Osservazioni di particolare interesse anno 2017	6
Elenco di tutte le specie “molto rare” – “rare” – “poco frequenti” osservate nel 2017	17
Ringraziamenti	18
Bibliografia – Sitografia e Altre fonti	19

- Introduzione

In questo resoconto sono state inserite le segnalazioni di avifauna osservata nell'anno 2017 in Provincia di Varese che hanno particolare interesse a livello provinciale per rarità, fenologia, numero di individui osservati, nidificazione o svernamento.

Tali segnalazioni fanno riferimento ai dati inseriti nella *Lista degli uccelli della provincia di Varese* aggiornata al 2017 <https://gruppoinsubrico.com/hotspot-e-avifauna/>

Le segnalazioni sono state raccolte con il contributo di numerosi osservatori e attraverso alcune ricerche effettuate dai membri del Gruppo Insubrico di Ornitologia.

La quasi totalità di queste segnalazioni è presente nel portale www.ornitho.it


Le specie considerate **appartenenti alle sole categorie A B C**, in riferimento alla "Lista CISO-COI degli uccelli Italiani" Parte prima liste A, B e C" (Fracasso et al., 2009) e Parte seconda le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie "di servizio" (cat. D, E, X) (Bacetti et al., 2014), osservate e segnalate in tempi recenti e passati nella Provincia di Varese alla data del 31/12/2017 **sono 343**.

Per quanto riguarda il solo anno 2017 sono oltre 60.000 i dati inseriti nel portale www.ornitho.it e **246 le specie complessivamente osservate nel corso dell'anno in provincia di Varese**, tra queste alcune specie nuove mai segnalate nella nostra provincia (Aquila imperiale, Falco della Regina, Stercorario mezzano), alcune altre in precedenza escluse ma ora considerate poiché assegnate (solo o anche) alla cat. "C" perché naturalizzate all'estero o in Italia (alcune anche in provincia di Varese).

Presenti inoltre interessanti recenti conferme di avvenuta nidificazione (Passero solitario, Gufo reale, Biancone) o nidificazioni di specie che non venivano confermate da alcuni decenni (Codirossone).

Nel grafico di figura 1 (numero specie segnalate nei vari mesi dell'anno 2017) si può osservare che i mesi più ricchi di specie sono aprile e maggio (170), che corrispondono al periodo centrale della migrazione pre riproduttiva, e i mesi di agosto (149) e settembre (144) che corrispondono al periodo iniziale della migrazione post riproduttiva, dove oltre ai primi migratori sono ancora presenti alcune specie nidificanti o estivanti.

Nel mese di gennaio (115), che con il ridotto numero di specie coincide con il periodo di pausa migratoria, sono invece presenti quasi esclusivamente le sole specie migratrici svernanti/invernali o residenti, anche se alle nostre latitudini non si può escludere qualche movimento migratorio già in atto.



- Fenologia provinciale

Per la fenologia dell'avifauna osservata si è cercato di indicare le caratteristiche della specie in riferimento alla presenza sul territorio provinciale.

Tali categorie fenologiche si ispirano a quelle proposte da "Fasola e Brichetti (1984)" con alcuni adattamenti in relazione al contesto territoriale e alla modalità espositiva adottata.

S = Sedentaria: specie legata per tutto il periodo dell'anno al territorio provinciale nel quale la specie normalmente si riproduce.

Sst = Sedentaria storica: specie sedentaria non più osservata sul territorio provinciale dopo l'anno 2000.

B = Nidificante (breeding): specie che si riproduce con certezza in un determinato territorio e che nidifica, o ha comunque nidificato, nel secolo attuale sul territorio provinciale.

Normalmente le specie sedentarie sono e vengono definite anche nidificanti (S B).

A livello provinciale può essere che qualche specie sia stata definita sedentaria non nidificante in considerazione del fatto che la nidificazione non è stata riscontrata in provincia e probabilmente avviene in zone limitrofe confinanti.

B? = Nidificante probabile: specie che probabilmente nidifica, o ha probabilmente nidificato, nel secolo attuale sul territorio provinciale. Questa indicazione fenologica non viene indicata per quelle specie che pur avendo "probabilmente" nidificato in passato (prima del 2001) non hanno avuto alcun riscontro di nidificazione certa o probabile nel secolo attuale.

Bst = Nidificante storica: specie che si è riprodotta con certezza in tempi passati (non in questo secolo) sul territorio provinciale. Può essere associato a B? quando ci sono prove di nidificazione probabile nel secolo attuale.

M = Migratrice: specie che compie ogni anno spostamenti dalle aree di riproduzione alle aree di svernamento e viceversa o che effettua movimenti dispersivi o spostamenti a corto raggio. Compare o è comparsa, regolarmente o irregolarmente, nel territorio provinciale. Essendo questa una lista provinciale si è ritenuto di non associare a tale categoria l'indicazione relativa alla regolarità (specie migratrice regolare o irregolare) e di fare riferimento al solo indice relativo al campo "Frequenza osservazioni / Livello di diffusione".

W = Svernante (wintering): specie migratrice (anche parzialmente) che passa l'inverno o parte di esso in un determinato territorio e che abbandona in primavera per dirigersi verso le aree di nidificazione. A livello provinciale può essere associato anche a specie più correttamente dette "invernali", osservate o osservabili nei mesi di dicembre/gennaio senza necessariamente avere certezza del tempo di permanenza nel territorio provinciale. L'associazione con "**irr**" (**Wirr**) **irregolare/occasionale** definisce l'irregolarità, l'occasionalità o la temporaneità della presenza invernale (breve sosta, numero limitato di individui) nella nostra provincia in relazione alle recenti osservazioni.

A = Accidentale: specie che capita in modo assolutamente sporadico, singolarmente o con un numero limitato di individui, normalmente provenienti da aree lontane a quelle dell'osservazione. Nella Lista sono state definite accidentali le specie segnalate almeno 1 volta nel secolo attuale con un massimo di 10 segnalazioni totali successive all'anno 1950 o le specie segnalate sino ad un massimo di 3 volte in questo secolo. A questa categoria viene associato il numero delle segnalazioni documentate **A_x (y)**, dove "**x**" è il numero delle segnalazioni totali e "**(y)**" il numero delle segnalazioni relative al solo secolo attuale.

Ast = Accidentale storica: nella Lista sono state definite accidentali storiche le specie con almeno una segnalazione antecedente l'anno 2001 ma mai segnalate in questo secolo. A questa categoria, quando possibile, viene associato il numero delle segnalazioni documentate.

Int = Introdotta: specie introdotta volontariamente o involontariamente, non necessariamente nel territorio provinciale, che è normalmente in grado di auto sostenersi.

Rip = Ripopolata: specie che è stata introdotta o viene regolarmente introdotta (es. a scopi venatori) e che non è sempre in grado di auto sostenersi all'interno del territorio provinciale (o in certi casi lo è solo parzialmente).

? = Incerto/probabile: associato ad un carattere fenologico per indicare possibili dubbi.

I caratteri fenologici sono normalmente posti in ordine decrescente di importanza in riferimento alla fenologia della specie considerata.

- Frequenza osservazioni / livello di diffusione

La determinazione di questo indice si basa in modo particolare sui dati contenuti nella piattaforma www.ornitho.it.

La formulazione di questo campo consente, attraverso l'analisi del numero dei dati e degli anni in cui sono avvenute le segnalazioni, la valutazione di "massima" del livello di diffusione e presenza delle specie osservate e inserite in questo documento.

Per quanto riguarda questo indice e le relative analisi si devono comunque considerare alcuni aspetti, come l'elusività di alcune specie e la conseguente difficoltà di individuazione o i dati relativi alle specie rare o poco frequenti che possono essere ripetutamente segnalate da più osservatori per l'interesse determinato dall'osservazione.

Di seguito gli indici attribuiti ad ogni specie, alcuni di questi indici sono ottenuti in relazione alla media annuale del numero di osservazioni degli ultimi 8 anni (2010 – 2017):

Molto freq. – Specie osservata molto frequentemente

Freq. – Specie osservata frequentemente

Poco freq. – Specie osservata poco frequentemente

Rara – Specie osservata raramente, abbastanza raramente o irregolarmente

Molto rara – Specie con fenologia "Accidentale" osservata almeno 1 volta in questo secolo

Stor. - Specie con fenologia "Accidentale storica" o "Sedentaria storica" mai osservata in questo secolo

- Osservazioni di particolare interesse anno 2017 (ordinamento sistematico)

Oca lombardella	<i>Anser albifrons</i>	A? (2)	Molto rara
-----------------	------------------------	--------	------------

Accidentale provinciale, 2 segnalazioni in questo secolo

- (2017) 38 indd. il 29 gen. a Lonate Pozzolo sul Fiume Ticino osservati in volo provenienti da una zona nei pressi di Oleggio (NO) dove hanno sostato dal 26 gen. al 12 feb. (E.Giussani/ornitho).

La precedente segnalazione è relativa a dicembre 2010.

Nel secolo scorso definita di comparsa regolare sui nostri laghi, segnalazioni Lago Maggiore e Varese anni: 1969 1968 1966 1960 1956 1954 1950 e antecedente 1950 (Bianchi et al. 1973).

Orchetto marino	<i>Melanitta nigra</i>	M W	Poco freq.
-----------------	------------------------	-----	------------

Osservato in particolare sul Lago Maggiore in numero sempre limitato di indd., periodo dicembre/marzo.

- (2017) Unica segnalazione: 1 ind. il 13 mar. sul Lago Maggiore a Sesto Calende (L.Favretto/ornitho).

Quattrocchi	<i>Bucephala clangula</i>	M W	Poco freq.
-------------	---------------------------	-----	------------

Osservato solitamente nei mesi invernali, in particolare Lago Maggiore e Lago di Varese.

- (2017) Interessante numero di indd.: 15 indd. IWC del 15 gen. Lago di Varese (L.Giussani, R.Aletti et al./ornitho).

Smergo minore	<i>Mergus serrator</i>	M W	Poco freq.
---------------	------------------------	-----	------------

La quasi totalità delle osservazioni è relativa al Lago Maggiore nel periodo invernale, indd. isolati o gruppetti di pochi individui.

- (2017) Alcune osservazioni (max 5 indd.) nei mesi di gen. feb. mar. nov. nella zona meridionale del Lago Maggiore.

Strolaga minore	<i>Gavia stellata</i>	M W	Poco freq.
-----------------	-----------------------	-----	------------

Le osservazioni sono relative al Lago Maggiore e Lago di Varese nel periodo invernale e di inizio primavera.

- (2017) 6 – 7 segnalazioni di 1 – 3 indd. nelle zone centro meridionali del Lago Maggiore

Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides</i>	M	Rara
------------------	--------------------------	---	------

Quasi sempre indd. isolati in spostamento migratorio nel periodo da aprile a agosto.

- (2017) Qualche indd. isolato osservato quasi esclusivamente nei mesi di aprile e maggio, in particolare Lago di Varese e Lago Maggiore.

Cicogna bianca	<i>Ciconia ciconia</i>	M	Rara
----------------	------------------------	---	------

Poche le segnalazioni, solitamente osservata nei mesi primaverili.

- (2017) Unica segnalazione: 1 ind. 12 ago. a Ispra (J.Ferrario/ornitho).

Nel corso di quest'anno siamo venuti a conoscenza della nidificazione di una coppia negli anni 2016 e 2015 nei pressi dell'Agriturismo Cascina Gaggio di Besnate (rif. V.Uboldi proprietario dell'agriturismo. La notizia è stata anche riportata sulla pagina FB dello stesso agriturismo).

La notizia è in attesa di verifica, qualora confermata si tratterebbe della prima nidificazione nel territorio provinciale. Un precedente tentativo avvenuto nella primavera 2008 in località Schiranna Lago di Varese non era andato a buon fine.

Ibis sacro	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	M Int	Rara
------------	---------------------------------	-------	------

Probabile che i soggetti osservati siano provenienti da province vicine (VC NO) dove la specie ha formato una popolazione stabile residente (prima nidificazione nel 1989 in provincia di VC). La specie e' comunque in espansione territoriale e non si possono escludere movimenti migratori a corto raggio.

- (2017) Unica segnalazione: 2 indd. il 14 gen. loc. Bruschera Angera (rif. F.Aresi/ornitho).

Svasso collaroso	<i>Podiceps grisegena</i>	M Wirr	Poco freq.
------------------	---------------------------	--------	------------

La quasi totalità delle osservazioni è relativa al Lago Maggiore.

- (2017) Alcune osservazioni (max 3 indd.) nei mesi di gen. lug. nov. e dic. nella zona meridionale del Lago Maggiore, il 27 nov. l'unica segnalazione relativa al Lago di Varese.

Svasso cornuto	<i>Podiceps auritus</i>	M Wirr	Poco freq.
----------------	-------------------------	--------	------------

Le osservazioni sono tutte relative al Lago Maggiore e al Lago di Varese, periodo invernale e di inizio primavera.

- (2017) Alcune osservazioni (max 3 indd.) nei mesi di gen. feb. mar. e dic. nella zona meridionale del Lago Maggiore.




Svasso cornuto - 19/12/2017 Lago Maggiore (foto Roberto Aletti)

Grifone	<i>Gyps fulvus</i>	A9 (9)	Molto rara
---------	--------------------	--------	------------

Accidentale provinciale, 9 segnalazioni tutte in questo secolo

- (2017) 8 indd. il 12 giu. loc. Sass de Ferr Laveno Mombello (R.Tomasini/ornitho)
- (2017) 7 indd. il 11 giu. a Duno (R.De Ricco/ornitho)
- (2017) 2 indd. il 17 mag. osservati a distanza di mezz'ora sopra il Monte Cuvignone a Cittiglio e provenienti dalla stessa direzione (C.Parnell./ornitho)

Le precedenti 6 segnalazioni sono relative agli anni: 2016 2015 2014 2013 2010



Grifone 2 indd. – 17/05/2017 Monte Cuvignone Cittiglio (foto Colin Parnell)

Biancone	<i>Circaetus gallicus</i>	M B	Poco freq.
----------	---------------------------	-----	------------

Mesi di maggior presenza: marzo, aprile e settembre.

Dopo il 2009 si stimano 2-3 coppie nidificanti nel territorio provinciale.

- (2017) (L. Colombo per Team Astor) nidificazione di 1 coppia con l' involo dell'unico nato nel corso della stagione riproduttiva nella porzione centro-settentrionale della provincia.

Poiana	<i>Buteo buteo</i>	S B M W	Molto freq.
--------	--------------------	---------	-------------

Numero massimo delle osservazioni nei mesi di marzo aprile.

- (2017) Una interessante segnalazioni relativa alla ssp *vulpinus* Poiana delle steppe: 1 ind. il 12 ago. in Veddasca (F.Saporetti, W.Guenzani/ornitho)

Aquila minore	<i>Hieraetus pennatus</i>	M	Rara
---------------	---------------------------	---	------

- (2017) Unica segnalazione: 1 ind. il 22 set. A Lonate Pozzolo (F.Casale/ornitho)

Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>	S B?	Poco freq.
--------------	--------------------------	------	------------

Le recenti osservazioni, quasi tutte effettuate nella parte settentrionale della provincia, sono relative a soggetti di diverse classi di età.

Molto probabile la presenza di alcuni individui erratici provenienti dalle Alpi, ma alcune ripetute e ravvicinate osservazioni anni 2014-2017 fanno pensare alla presenza stabile di qualche individuo nel territorio provinciale.

- (2017) (G.I.O.) Segnalazioni di nidificazione probabile (ripetuta presenza di almeno una coppia nel periodo primaverile con comportamento territoriale e volo a festoni), nessuna conferma di nidificazione certa.
Non si può comunque escludere che presenza e comportamenti siano da riferirsi a qualche coppia nidificante in Svizzera.

Aquila imperiale	<i>Aquila heliaca</i>	A2 (2)	Molto rara
------------------	-----------------------	--------	------------

Accidentale provinciale, segnalata per la prima volta nel 2017

- (2017) 1 ind. imm. il 4 mag. a Casorate Sempione (S.Daverio/ornitho)
- (2017) 1 ind. il 1 apr. a Castelvecchana (L.Nigro/ornitho)



Aquila imperiale - 4/05/2017 Casorate Sempione (foto Simona Daverio)

Smeriglio	<i>Falco columbarius</i>	M Wirr	Poco freq.
-----------	--------------------------	--------	------------

Osservato principalmente nel periodo da gennaio a aprile e da ottobre a dicembre

- (2017) Una decina le segnalazioni (feb. apr. nov. dic.), sempre indd. isolati osservati nella parte centro-settentrionale della provincia.

Falco della Regina	<i>Falco eleonorae</i>	A1 (1)	Molto rara
--------------------	------------------------	--------	------------

Accidentale provinciale, segnalato per la prima volta nel 2017

- (2017) 1 ind. 2cy 17 ago. in migrazione sopra il Monte Cuvignone Cittiglio (L.Giussani, A.Pentassuglia, M.Bergomi/ornitho).



Falco della Regina – 17/08/2017 Monte Cuvignone (foto Luca Giussani)

Beccaccia di mare	<i>Haematopus ostralegus</i>	M	Poco freq.
-------------------	------------------------------	---	------------

Solitamente individui isolati periodo aprile/giugno e agosto/settembre, Lago Maggiore principalmente Germignaga Foce Tresa, Ispra e Monvalle

- (2017) 4 o 5 indd. isolati osservati nei mesi di maggio e settembre sul Lago Maggiore tra Germignaga e Ispra.

Piviere tortolino	<i>Charadrius morinellus</i>	A7 (5)	Molto rara
-------------------	------------------------------	--------	------------

Accidentale provinciale, 7 segnalazioni totali di cui 5 in questo secolo

- (2017) 1 ind. in migrazione notturna il 12 set. a Ternate (registraz. vocale - L.Giussani/ornitho)
- (2017) 1 ind. in migrazione notturna il 5 set. a Ternate (registraz. vocale - L.Giussani/ornitho)

Le precedenti segnalazioni sono relative agli anni 2016 2013 2004 1961 1957

Pivieressa	<i>Pluvialis squatarola</i>	A6 (5)	Molto rara
------------	-----------------------------	--------	------------

Accidentale provinciale, 6 segnalazioni totali di cui 5 in questo secolo

- (2017) 4 indd. il 1 mag. alla foce del fiume Tresa a Germignaga (F.Saporetti, L.D'Orazio, M.Bergomi/ornitho)



Pivieressa – 1/05/2017 Foce Tresa (foto Marco Vaghi)

Gambecchio nano	<i>Calidris temminckii</i>	M	Rara
-----------------	----------------------------	---	------

Le osservazioni sono in gran parte riferite ad alcune località del Lago Maggiore (Ispra, Monvalle, Angera, foce del Tresa a Germignaga) e Vasche Arnetta Lonate Pozzolo.

- (2017) Unica segnalazione: 1 ind. il 31 ago. e 1 set. in loc. Bruschera Angera (L.Prada, L.Giussani/ornitho)

Piovanello comune	<i>Calidris ferruginea</i>	M	Poco freq.
-------------------	----------------------------	---	------------

Scarsamente osservato, solitamente in numero limitato di individui e quasi esclusivamente nei mesi di fine estate, in particolare con condizioni di basso livello idrico del Lago Maggiore (Besozzo, Ispra, Germignaga, Angera).

- (2017) Unica segnalazione: 1 ind. il 24 set. alla foce del fiume Tresa a Germignaga (O.Brambilla/ornitho)

Totano moro	<i>Tringa erythropus</i>	M	Rara
-------------	--------------------------	---	------

Le poche osservazioni sono quasi tutte relative al Lago Maggiore e alle Vasche Arnetta di Lonate Pozzolo, numero massimo delle osservazioni nei mesi di aprile e settembre.

- (2017) Alcune osservazioni (max 3 indd.) mesi di aprile e novembre Lago Maggiore

Voltapietre	<i>Arenaria interpres</i>	M	Poco freq.
-------------	---------------------------	---	------------

Tutte le osservazioni sono relative al Lago Maggiore, in particolare mesi di agosto settembre e ottobre, poche nel periodo primaverile.

- (2017) Unica segnalazione: 2 indd. il 28 apr. alla foce del Tresa a Germignaga (F.Saporetto, M.Tomasi, M.Bergomi/ornitho)

Stercorario mezzano	<i>Stercorarius pomarinus</i>	A1 (1)	Molto rara
---------------------	-------------------------------	--------	------------

Accidentale provinciale, segnalato per la prima volta nel 2017

- (2017) 1 ind. 1cy morfismo scuro 8 e 12 dic. (lo stesso ind. nelle due date) a Ranco e Ispra Lago Maggiore (L.Giussani et al./ornitho).

Alcune precedenti segnalazioni, considerate in passato da alcuni autori, non sono state prese in considerazione per le ragioni di seguito indicate:

- (Bianchi et al. 1973) una cattura Lago Maggiore ma Belgirate (esclusa perchè sponda piemontese)
- (Monti 1845) una osservazione generica presso Angera (esclusa perché generica)



Stercorario mezzano – 8/12/2017 Lago Maggiore (foto Luca Giussani)

Gabbiano tridattilo	<i>Rissa tridactyla</i>	A7 (2)	Molto rara
---------------------	-------------------------	--------	------------

Accidentale provinciale, 7 segnalazioni totali di cui 2 in questo secolo

- (2017) 1 ind. 1cy 8 e 9 dic. a Porto Ceresio (D.Ronconi et al./ornitho)

Le precedenti segnalazioni sono relative agli anni: 2012 1998 1965 1947 1937 1926



Gabbiano tridattilo – 9/12/2017 Lago Ceresio (foto Roberto Aletti) Gabbiano tridattilo – 9/12/2017 Lago Ceresio (foto Luca Giussani)

Mignattino piombato	<i>Chlidonias hybridus</i>	M	Rara
---------------------	----------------------------	---	------

Le poche osservazioni si riferiscono quasi esclusivamente al Lago Maggiore e al Lago di Varese, numero max indd. oss. 11/05/2014 12 indd. Lago Varese (R.Aletti, L.Laddaga/ornitho).

- (2017) Alcune osservazioni (max 3 indd.) a maggio e settembre Lago Maggiore, Lago di Varese e Lonate Pozzolo

Mignattino alibianche	<i>Chlidonias leucopterus</i>	M	Rara
-----------------------	-------------------------------	---	------

Le osservazioni si riferiscono quasi esclusivamente al Lago Maggiore e al Lago di Varese.

- (2017) Poche osservazioni (max 2 indd.) a maggio, agosto e settembre a Besozzo Lago Maggiore

Beccapesci	<i>Sterna sandvicensis</i>	A6 (6)	Molto rara
------------	----------------------------	--------	------------

Accidentale provinciale, 6 segnalazioni totali tutte in questo secolo

- (2017) 1 ind. ad. ab. inv. il 23 ago a Brebbia/Ispra Lago Maggiore (L.Prada et al./ornitho)
- (2017) 1 ind. il 11 lug. alla Foce del Tresa a Germignaga (M.Bergomi, A.Pentassuglia et al./ornitho)

Le precedenti segnalazioni sono relative agli anni: 2015 2011 2005 2004



Beccapesci – 23/08/2017 Lago Maggiore (foto Roberto Aletti)

Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>	M Bst	Poco freq.
---------------	-----------------------	-------	------------

Qualche osservazioni durante la migrazione primaverile e autunnale, in particolare Lago Maggiore, Lago di Varese e Vasche Arnetta Lonate Pozzolo.

- (2017) Discreta presenza nei mesi luglio e agosto Lago Maggiore Ispra/Monvalle sino a oltre 14 indd. osservati insieme



Sterna comune – 11/08/2017 Lago Maggiore (foto Roberto Aletti)

Barbagianni	<i>Tyto alba</i>	S B? M Bst	Rara
-------------	------------------	------------	------

Oltre all' esigua popolazione locale, possibili erratismi anche a medio raggio di individui giovani durante il periodo autunnale.

- (2017) Solo un paio di segnalazioni nella parte centrale della Provincia

Gufo reale	<i>Bubo bubo</i>	S B	Rara
------------	------------------	-----	------

(G.I.O.) Ricerca specie rupicole Gruppo Insubrico di Ornitologia anni 2016-2017: dal 17/06/2016 (data prima osservazione) al 31/12/2017 segnalati alcuni indd. (m. ad, f. ad., juv. dell'anno) in tre diverse località situate nella parte centro-settentrionale della provincia.

- (2017) (G.I.O.) Mese di maggio confermata nidificazione in una diversa località rispetto al 2016 sempre situata nella parte centro-settentrionale della provincia (1 coppia e almeno 2 giovani).

Rondone pallido	<i>Apus pallidus</i>	M Bst	Rara
-----------------	----------------------	-------	------

Numero limitato di osservazioni periodo da marzo a ottobre.

- (2017) Poche osservazioni (max 4 indd.) nei mesi di aprile, maggio e ottobre nei dintorni di Varese e nella parte settentrionale della provincia.

Ghiandaia marina	<i>Coracias garrulus</i>	M Bst	Rara
------------------	--------------------------	-------	------

- (2017) 1 ind. 17 ago. a Lonate Pozzolo (M.Pisoni rif. F.Casale/ornitho)
- (2017) 1 ind. f. 18 e 19 mag. a Lonate Pozzolo (F.Bergo, F.Lorenzini et al./ornitho)



Ghiandaia marina – 19/05/2017 Lonate Pozzolo (foto Roberto Aletti)

Calandrella	<i>Calandrella brachydactyla</i>	A2 (1)	Molto rara
-------------	----------------------------------	--------	------------

Accidentale provinciale, 2 segnalazioni totali di cui 1 in questo secolo

- (2017) >2 indd. dal 30 apr. al 6 mag. a Brebbia (L.Giussani et al./ornitho)

La precedente segnalazione è relativa al 1965



Calandrella – 2/05/2017 Brebbia (foto Luca Giussani)



Calandrella – 2/05/2017 Brebbia (foto Roberto Aletti)

Tottavilla	<i>Lullula arborea</i>	M Wirr	Rara
------------	------------------------	--------	------

Poche osservazioni, più frequentemente relative ai mesi autunnali.

- (2017) Poche osservazioni (max 3 indd.) nei mesi di ottobre e novembre nella parte centro-settentrionale della provincia.

Rondine rossiccia	<i>Cecropis daurica</i>	A5 (5)	Molto rara
-------------------	-------------------------	--------	------------

Accidentale provinciale, 5 segnalazioni totali tutte in questo secolo

- (2017) 1 ind. 25 apr. a Rancio Valcuvia (M.Bergomi, A.Pentassuglia/ornitho)

Le precedenti segnalazioni sono relative agli anni 2016 2015 2010 2003

Calandro	<i>Anthus campestris</i>	M B?	Rara
----------	--------------------------	------	------

Osservazioni quasi esclusivamente nei mesi di aprile, maggio, giugno

- (2017) 1 – 3 indd. dal 27 apr. al 9 mag. a Brebbia (L.Giussani, L.Nigro et al./ornitho)

Pispola golarossa	<i>Anthus cervinus</i>	M	Rara
-------------------	------------------------	---	------

La quasi totalità delle osservazioni è relativa ai mesi di aprile maggio

- (2017) Poche osservazioni nei mesi di aprile e maggio nella parte centro-settentrionale della provincia



Pispola golarossa – 25/04/2017 Foce Tresa (foto Fabio Saporetti)

Pettazzurro	<i>Luscinia svecica</i>	M	Rara
-------------	-------------------------	---	------

Osservazioni solitamente nel periodo di fine estate e inizio autunno, in particolare Palude Brabbia e nella vegetazione rivierasca del Lago Maggiore (Ispra, Monvalle).

- (2017) Pochissimi indd. isolati aprile agosto e settembre Brebbia/Ispra e Lonate Pozzolo

Codirossone	<i>Monticola saxatilis</i>	M B	Rara
-------------	----------------------------	-----	------

Nel periodo primaverile-estivo anni 2016 e 2017 alcune osservazioni nella parte centro-settentrionale della provincia

- (2017) (G.I.O.) Prima conferma nid. certa in questo secolo (il precedente dato di nidif. certa risale al 1987): alta Veddasca 11 giu. m.ad. con imbeccata (M.Viganò, A.Pentassuglia, M.Bergomi/ornitho), 18 giu. m.ad. con imbeccata (L.Nigro/ornitho), 22 lug. f.ad. che imbecca un juv. già uscito dal nido (L.Giussani, R.Aletti/ornitho).



Codirossone – 22/07/2017 Alta Veddasca (foto Roberto Aletti)

Passero solitario	<i>Monticola solitarius</i>	M Wirr S? B	Rara
-------------------	-----------------------------	-------------	------

- (2017) (G.I.O.) Nel mese di giugno confermata nidificazione di una coppia in alta provincia (C.Parnell, R.Aletti/ornitho) nello stesso luogo dove a maggio 2014 era stata documentata la prima nidificazione in questo secolo (M.Carabella, F.Pianezza et al./ornitho). Negli anni 2015 e 2016 solo dati di nidificazione probabile.

Merlo dal collare	<i>Turdus torquatus</i>	M Bst	Rara
-------------------	-------------------------	-------	------

- (2017) 2 indd. della ssp nominale *torquatus* il 6 e 7 nov. nei pressi di Brebbia (L.Giussani et al./ornitho), quinta segnalazione in questo secolo. Interessante osservazione, oltre che per la rarità della specie, perché avvenuta in una zona di pianura al di fuori da un contesto montano.



Merlo dal collare – 7/11/2017 Brebbia (foto Alessio Martinoli)

Canapino maggiore	<i>Hippolais icterina</i>	M	Rara
-------------------	---------------------------	---	------

Le poche osservazioni si riferiscono ai mesi di aprile, maggio, agosto e settembre.

- (2017) Tre sole segnalazioni di 1 – 2 indd. a maggio e agosto nella parte centrale della provincia.

Magnanina comune	<i>Sylvia undata</i>	A3 (3)	Molto rara
------------------	----------------------	--------	------------

Accidentale provinciale, 3 segnalazioni totali tutte in questo secolo

- (2017) >1 ind. m.ad. dal 13 al 22 gen. a Lonate Pozzolo (F.Bergo, F.Lorenzini et al./ornitho)

Le precedenti segnalazioni sono relative agli anni 2016 2007



Magnanina comune – 21/01/2017 Lonate Pozzolo (foto Luca Giussani)

Sterpazzolina comune	<i>Sylvia cantillans</i>	M B? Bst	Rara
----------------------	--------------------------	----------	------

Poche segnalazioni presenti, solitamente indd. isolati osservati nel periodo primaverile

- (2017) 1 ind. il 25 apr. a Luino (L.Nigro/ornitho)
- (2017) 1 ind. (ssp *albistriata*) il 27 mar. Palude Brabbia (L.Giussani, L.Favretto/ornitho)

Luì forestiero	<i>Phylloscopus inornatus</i>	A5 (5)	Molto rara
----------------	-------------------------------	--------	------------

Accidentale provinciale, 5 segnalazioni totali tutte in questo secolo

- (2017) 1 ind. il 7 nov. in Palude Brabbia (L.Favretto/ornitho)

Le precedenti segnalazioni sono relative agli anni 2015 2014 2007

Balia dal collare	<i>Ficedula albicollis</i>	A7 (7)	Molto rara
-------------------	----------------------------	--------	------------

Accidentale provinciale, 7 segnalazioni tutte in questo secolo

- (2017) 1 ind. 7 mag. m.ad. Bruschera Angera (G.I.O.)
- (2017) 3 indd. (m. ad. + m. 2° anno + f. ad.) dal 25 al 27 apr. a Germignaga (M.Viganò et al./ornitho)

Le precedenti segnalazioni sono relative agli anni 2016 2013 2012 2008

Picchio muraiolo	<i>Tichodroma muraria</i>	M W	Poco freq.
------------------	---------------------------	-----	------------

Presente nel periodo autunnale-invernale, sempre in numero limitato di individui, su alcune pareti rocciose della parte centro settentrionale della provincia.

- (2017) Alcune segnalazioni (max 2 indd.) nella parte centro settentrionale della provincia

Corvo comune	<i>Corvus frugilegus</i>	M W	Poco freq.
--------------	--------------------------	-----	------------

- (2017) Interessante numero di indd. osservati: 28 nov. due stormi in migrazione per un totale di 63 indd. (9 + 54) Rancio Valcuvia (M.Carabella/ornitho).

Fringuello alpino	<i>Montifringilla nivalis</i>	A2 (1)	Molto rara
-------------------	-------------------------------	--------	------------

Accidentale provinciale, 2 segnalazioni totali di cui 1 in questo secolo.

Specie sedentaria nidificante sulle Alpi e migratore irregolare. Le poche osservazioni provinciali si riferiscono probabilmente a migratori invernali o a fenomeni di erratismo.

- (2017) 1 ind. il 28 dic. loc. Sasso Galletto a Castelveccona (L.Giussani/ornitho), interessante segnalazione anche per la quota altitudinale 200 mt s.l.m.

La precedente segnalazione è relativa all' anno 1963, altre non considerate perché non meglio documentate anni 1946 1945



Fringuello alpino – 28/12/2017 Castelveccona (foto Luca Giussani)

Venturone alpino	<i>Carduelis citrinella</i>	M W Bst	Rara
------------------	-----------------------------	---------	------

La quasi totalità delle osservazioni è relativa alla parte montana della provincia, in particolare Veddasca.

- (2017) 4 segnalazioni di 1 – 2 indd. isolati nei mesi di marzo maggio ottobre e dicembre nella parte settentrionale della provincia

Organetto	<i>Carduelis flammea</i>	M Bst	Rara
-----------	--------------------------	-------	------

Il nome scientifico considerato è quello attribuito nella LISTA CISO COI (Fracasso et al., 2009) dove la specie non risulta ancora separata

Individui in migrazione verso l'areale di svernamento o provenienti dall'area alpina (dove la ssp *cabaret* e' sedentaria e nidificante), le poche osservazioni provinciali sono probabilmente quasi tutte riconducibili alla ssp *cabaret*, rara anche nel secolo scorso la ssp nominale *flammea*

- (2017) Unica segnalazione: 1 ind. il 19 dic. a Cadrezzate (L.Giussani/ornitho)

Ciuffolotto	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	M W S? B? Bst	Poco freq.
-------------	--------------------------	---------------	------------

Non si esclude qualche individuo sedentario in particolare nella parte centro-settentrionale della provincia.

- (2017) Dalla fine di novembre a tutto dicembre una decina di segnalazioni della ssp nominale *pyrrhula* Ciuffolotto trombettiere.

Zigolo delle nevi	<i>Plectrophenax nivalis</i>	A5 (4)	Molto rara
-------------------	------------------------------	--------	------------

Accidentale provinciale, 5 segnalazioni totali di cui 4 in questo secolo.

- (2017) 1 ind. il 2 dic. loc. Monvallina Lago Maggiore (L.Prada/ornitho)

Le precedenti segnalazioni sono relative agli anni 2015 2013 2012 1963

Strillozzo	<i>Miliaria calandra</i>	M B	Rara
------------	--------------------------	-----	------

Le poche osservazioni sono quasi tutte relative al periodo primaverile.

- (2017) 6 segnalazioni di 1 – 2 indd. nella parte centro meridionale della provincia.

- Elenco completo specie “molto rare” – “rare” – “poco frequenti” osservate nel 2017

Sono 246 le specie totali osservate in provincia di Varese nel corso del 2017.

Tra queste 143 sono quelle che, in relazione ai criteri adottati, risultano avere un indice di frequenza osservazione “molto raro”, “raro” o “poco frequente”. Qui di seguito l’elenco in ordine crescente di numero osservazioni in relazione alla media degli ultimi 8 anni (2010 – 2017 dalle meno osservate alle più osservate).

1	2	3	4
Calandrella	Tottavilla	Combattente	Torcicollo
Fringuello alpino	Zigolo nero	Corvo comune	Falco pescatore
Gabbiano tridattilo	Cicogna bianca	Piovanello tridattilo	Rigogolo
Lui forestiero	Gambecchio nano	Aquila reale	Saltimpalo
Magnanina comune	Moretta grigia	Anatra mandarina	Sterpazzola
Oca lombardella	Pettazzurro	Falco cuculo	Orco marino
Pivieressa	Strillozzo	Forapaglie comune	Tarabuso
Rondine rossiccia	Venturone alpino	Forapaglie macchiettato	Cannaiola verdognola
Zigolo delle nevi	Calandro	Sterna comune	Piro-piro boschereccio
Falco della regina	Canapino maggiore	Strolaga minore	Pantana
Oca egiziana	Passero solitario	Svasso collaroso	Pendolino
Stercorario mezzano	Pispola golarossa	Gru	Mignattino comune
Balia dal collare	Sgarza ciuffetto	Sordone	Piovanello pancianera
Beccapesci	Beccaccia di mare	Upupa	Colino della Virginia
Piviere tortolino	Nocciolaia	Averla maggiore	Fischione
Aquila imperiale	Ortolano	Biancone	Fistione turco
Grifone	Picchio muraiolo	Ciuffolotto	Topino
Aquila minore	Piovanello comune	Gambecchio comune	Beccaccino
Barbagianni	Smeriglio	Zafferano	Piro-piro culbianco
Cicogna nera	Airone guardabuoi	Cincia alpestre	Tordo sassello
Coturnice orientale	Assiolo	Pavoncella	Gruccione
Fagiano di monte	Orchetto marino	Albanella reale	Canapino comune
Merlo dal collare	Smergo minore	Beccafico	Fanello
Organetto	Voltapietre	Lui verde	Gabbiano reale pontico
Codirossone	Albanella minore	Quattrocchi	Tarabusino
Colombella	Quaglia	Gabbianello	Falco pellegrino
Ghiandaia marina	Gufo comune	Succiacapre	Averla piccola
Mignattino alibianche	Nibbio reale	Svasso cornuto	Astore
Pernice rossa	Salciaiola	Corriere grosso	Marzaiola
Rondone pallido	Beccaccia	Tordela	Tortora selvatica
Sterpazzolina comune	Cavaliere d'Italia	Strolaga mezzana	Allodola
Chiurlo maggiore	Crociere	Zigolo giallo	Mestolone
Gufo reale	Pettegola	Gabbiano corallino	
Ibis sacro	Schiribilla	Lui bianco	
Mignattino piombato	Volpoca	Gabbiano reale nordico	
Starna	Codone	Rampichino alpestre	
Totano moro	Voltolino	Bigiarella	

Le restanti 103 specie (non elencate) osservate nel corso del 2017 risultano avere un indice frequenza osservazione “frequente” o “molto frequente”.

- Ringraziamenti

Si ringraziano:

- per i dati: i numerosi osservatori (compresi quelli non citati in questo resoconto) che hanno effettuato segnalazioni e inserito i loro dati per la quasi totalità nella piattaforma www.ornitho.it e tutti i soci del Gruppo Insubrico di Ornitologia per le segnalazioni derivate dalle ricerche effettuate.
- per le foto: Simona Daverio, Luca Giussani, Alessio Martinoli, Colin Parnell, Fabio Saporetti, Marco Vaghi.

- Bibliografia

- Aletti R., 2018 – Lista degli Uccelli della provincia di Varese aggiornata al 2017
<https://gruppoinsubrico.com/hotspot-e-avifauna/>
- Aletti R. , Carabella M. (a cura di), 2015 – Check – list degli uccelli della provincia di Varese – Lista completa commentata e illustrata, Quaderni del Gruppo Insubrico di Ornitologia, 2/2015.
- Bacetti N., Fracasso G., Gotti C., 2014 – Lista CISO-COI degli uccelli italiani – Parte seconda: le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie “di servizio” (cat. D, E, X). Avocetta 38: 1-21 (2014)
- Bianchi E. ,Martire L., Bianchi A., 1973 - Gli uccelli della provincia di Varese (Lombardia) Estratto da Riv. Ital. Orn. Editrice Succ. Fusi, Pavia.
- Fracasso G., Bacetti N., Serra L. (2009). La Lista CISO-COI degli uccelli italiani – parte prima: liste A, B e C. Avocetta, 33: 5-24
- Monti M., 1845 – Ornitologia Comense - Catalogo e notizie compendiose degli uccelli di stazione e di passaggio nella città provincia e diocesi di Como e loro Comasca sinonimia. Ed. F.lli Ostinelli

- Sitografia e Altre fonti

- Piattaforma: WWW.ornitho.it
- Gruppo Insubrico di Ornitologia (G.I.O.). Ricerche, segnalazioni e comunicazioni effettuate dai soci del Gruppo Insubrico di Ornitologia.