

Nr	LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017		Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.	Freq. oss.	NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE	NID. GR.	NID. Ult. anno nidif. certa
	Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia						
	ANSERIFORMES	ANATIDAE					
1	Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	S B M W	Molto freq.	- Specie introdotta nei laghi Svizzeri nella prima metà del secolo scorso e successivamente anche in Italia. Dalla fine del secolo scorso è andata sempre più diffondendosi la presenza di individui di origine domestica.	C	2017
2	Cigno nero	<i>Cygnus atratus</i>	M Int	Rara	- Specie introdotta o fuggita alla cattività e acclimatata in alcune nazioni europee compresa l'Italia.		
3	Cigno minore	<i>Cygnus columbianus</i>	Ast1?	Stor.	- (Bianchi et al. 1973) definito accidentale e rarissimo. "Qualcuno comparve sul Lago Maggiore insieme ad altri cigni selvatici il 7/02/1954 (Mart. Pag. 308)". (N.d.R. questa segnalazione indicata in riferimento al "Martorelli G., 1960 – Gli uccelli d' Italia terza edizione riveduta ed aggiornata dal dr. Edgardo Moltoni. Edizioni Rizzoli" non è stata riscontrata).		
4	Cigno selvatico	<i>Cygnus cygnus</i>	A8 (1)	Molto rara	- (A.Viganò rif.) dal 30/07/2007 al 6/09/2007 1 ind. Lago di Varese (N.d.R. non si esclude la possibile origine aufuga). - (Bianchi et al. 1973) definito di comparsa relativamente frequente sui nostri bacini maggiori. Segnalazioni documentate: 29/12/1968 1 ind. medio Verbano, 22/03/1968 2 indd. Angera, gen. 1963 5 indd. a Nord del Ponte di Oleggio, 4/03/1960 3 indd. Lago di Varese, gen. 1938 alcuni individui Lago Maggiore, inverno 1935/1936 1 ind. catturato a Lisanza, 19/01/1929 1 ind. f. catturato a Lisanza.		
5	Oca egiziana	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	M int	Molto rara	- Specie africana appartenente alle cat. C4 D1 E4 introdotta e naturalizzata, dubbi sulla provenienza selvatica, rilasciata o sfuggita con eventi riproduttivi in natura (Bacetti et al., 2014). - Naturalizzata in alcune province italiane, due segnalazioni provinciali: (Ornitho) 7/12/2017 1 ind. Lago di Comabbio (L.Giussani), 19 e 22/04/2015 2 indd. Lonate Pozzolo (A.Nicoli, D.Bernasconi).		
6	Oca granaiola	<i>Anser fabalis</i>	Ast	Stor.	- (Bianchi et al. 1973) definita la più frequente (tra le oche) sui nostri laghi nei mesi di gen./feb. Gen.1968 avvistamenti di piccoli gruppi a Lisanza Lago Maggiore, altre segnalazioni anni: 1965, 1963, 1962, 1960, 1959, 1957, 1956, 1955, 1954.		
7	Oca lombardella	<i>Anser albifrons</i>	A? (2)	Molto rara	- (Ornitho) 29/01/2017 38 indd. Fiume Ticino Lonate Pozzolo osservate in volo provenienti da una zona nei pressi di Oleggio (NO) dove hanno sostato dal 26/01 al 12/02/2017 (E.Giussani), 26/12/2010 15 indd. Azzate (F.Miglierina rif. G.Zanetti). - (Bianchi et al. 1973) definita di comparsa regolare sui nostri laghi, segnalazioni Laghi Maggiore e Varese anni: 1969 1968 1966 1960 1956 1954 1950 e antecedente 1950.		
8	Oca selvatica	<i>Anser anser</i>	M Wirr	Rara	- Non si può escludere che qualche individuo osservato possa essere di origine non completamente selvatica. - (Ornitho) osservazioni: dic 2016, feb giu ott nov 2013, lug 2010, apr 2006, giu 2005 (oss.vari). - (Saporetti & Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010: gen. 2008 2 indd. Lago Varese. - (EBN/BL) 1/04/2007 1 ind. Lago di Varese (P.e L.Casali), 9/03/2007 2 indd. Lago di Varese (P.e L.Casali), 31/03/2006 3 indd. Ispra (P.Casali). - (Tosi & Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000 : 1 ind. da gen. a mar. 1999 fiume Ticino, gen. 1999 per 2 settimane 9 indd. Lago di Comabbio, dal 27/02/2000 al 19/03/2000 3 indd. Palude Brabbia e Lago Varese. - (Bianchi et al. 1973) definita specie molto scarsa, segnalazioni anni: 1967,1963?,1954, passo straordinario inverno 1929.		

Nr	LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017  Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia		Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.	Freq. oss.	NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE	NID. GR.	NID. Ult. anno nidif. certa
9	Oca facciabianca	<i>Branta leucopsis</i>	Ast	Stor.	- (Tosi & Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000 : da feb. 1997 a apr. 1998 1 ind. probab. aufero fiume Ticino Sesto Calende. - (Bianchi et al. 1973) definita eccezionalmente rara. Viene indicata una sola cattura avvenuta nel 1878 sul Ceresio, ma nei pressi di Lugano Svizzera.		
10	Oca colombaccio	<i>Branta bernicla</i>	Ast	Stor.	- (Bianchi et al. 1973) definita accidentale e rara, notevole afflusso di questa specie nei mesi di gen. feb. dic. 1906, gen. 1907 e feb. 1927.		
11	Oca collarosso	<i>Branta ruficollis</i>	Ast2	Stor.	- (Bianchi et al. 1973) definita accidentale e rara : 9/11/1954 2 indd. osservati Lago di Varese, 9/11/1953 1 ind. ucciso Lago di Varese.		
12	Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	M Int	Rara	- Specie introdotta o fuggita alla cattivita. Non si puo' comunque escludere l'osservazione di qualche individuo proveniente da popolazioni naturalizzate in seguito all'introduzione a scopo ornamentale in alcuni paesi europei. Nella vicina Svizzera in certi periodi dell'anno sono presenti gruppi di diverse centinaia di indd.		
13	Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>	M Wirr	Poco freq.	- (Ornitho) La quasi totalita' delle osservazioni e' relativa al Lago Maggiore, Lago di Varese e Vasche Arnetta Lonate Pozzolo. - (A.Viganò rif.) 7/01/2008 e 12/07/2008 1 ind. loc. Arnetta Lonate Pozzolo, 6/09/2007 11 indd. loc. Arnetta Lonate Pozzolo, 3/04/2007 1 ind. loc. Arnetta Lonate Pozzolo. - (Saporetti & Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010 : 1998 11 indd. Lago Maggiore, 2001 2 indd. Lago di Lugano, 2010 2 indd. Lago di Lugano. - (Tosi & Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000 : 19/09/1997 2 indd. Lago di Varese. - (F.Casale rif.) 9/03/1982 1 ind. fiume Ticino Somma Lombardo. - (Bianchi et al. 1973) definita specie invernale di comparsa accidentale, segnalazioni anni: 1968,1910,1901?,1838.		
14	Anatra mandarina	<i>Aix galericulata</i>	S? M? B Int	Poco freq.	- Specie introdotta o fuggita alla cattivita. Ha occasionalmente nidificato nel territorio provinciale. ●Note nidificazione: - Prime nidificazioni conosciute: - (Ornitho) 18/05/2016 1 f. ad. con 3 pulcini Palude Brabbia (G.Taverna). - (Casale 2015) 25/09/2014 22 indd. dei quali la maggior parte giovani, Lagozza di Besnate (F.Casale).	F	2016
15	Fischione	<i>Anas penelope</i>	M W	Poco freq.	- (Saporetti & Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, 2005 3 indd. Palude Brabbia, 2002 8 indd. Lago Monate e Lago Maggiore. - (Tosi & Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000 : tra feb. 1997 e mar. 2000 69 indd. avvistati.		
16	Canapiglia	<i>Anas strepera</i>	M W S B	Freq.	- Specie essenzialmente migratrice, qualche individuo si ferma tutto l' anno nelle zone umide della provincia, in particolare Lago di Varese e Palude Brabbia. - A livello provinciale numero massimo indd. censiti 76 (IWC gennaio 2017). - (Saporetti & Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, inizialmente contattata sul Lago di Lugano nel 1995 ha poi iniziato un lento incremento con ampie fluttuazioni. ●Note nidificazione: - Tutte le recenti nidificazioni si riferiscono alla Palude Brabbia, Lago di Varese e Vasche Arnetta Lonate Pozzolo.	C	2017

Nr	<p style="text-align: center;">LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p style="text-align: center;">Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>	<p style="text-align: center;">Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p style="text-align: center;">Freq. oss.</p>	<p style="text-align: center;">NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">NID. GR.</p>	<p style="text-align: center;">NID. Ult. anno nidif. certa</p>
17	<p>Alzavola <i>Anas crecca</i></p>	M W B	Freq.	<p>- Mesi di maggior presenza: marzo, settembre, ottobre. - (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, durante i 25 anni di censimento è sempre stata limitata alla Palude Brabbia (max 193 indd. nel 2004) e in misura notevolmente minore sul Lago di Varese. ●Note nidificazione: - (EBN/IT) 13/08/2007 osservata femm. ad. con 1 pullo Palude Brabbia (P.Casali). - (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie è risultata nidificante con certezza sulla riva nord occidentale del Lago di Varese. Una coppia è stata seguita giornalmente da metà maggio fino alla prima settimana di giugno 2003, quando molto probabilmente si è allontanata in seguito alla distruzione del nido (Zanetti P. e G., Molinari, com.pers.). - (Tosi &amp; Zilio 2002) nella ricerca SIT-Fauna 1997/2000 viene indicata come probabile la nidificazione, sia pure saltuaria, di 1-2 coppie nella Palude Brabbia.</p>	C	2007
18	<p>Germano reale <i>Anas platyrhynchos</i></p>	S B M W	Molto freq.	<p>- Il numero massimo di presenze viene raggiunto nel periodo invernale e durante le fasi migratorie, dove agli individui residenti si aggiungono svernanti e migratori. - A livello provinciale numero massimo indd. censiti 1534 (IWC gennaio 2012).</p>	C	2017
19	<p>Codone <i>Anas acuta</i></p>	M Wirr	Poco freq.	<p>- Principali osservazioni mesi da gennaio a aprile. - Numero max indd. osservati: 21/03/2013 13 indd. Lago di Varese (Ornitho/L.Laddaga). - (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, 3 soli indd. censiti nel corso dei 25 anni: 2002 1 ind. fiume Ticino, 2009 1 ind. Lago Maggiore, 2009 1 ind. Lago di Lugano.</p>		
20	<p>Marzaiola <i>Anas querquedula</i></p>	M B	Poco freq.	<p>- Principalmente osservata durante la migrazione primaverile (marzo e aprile), meno frequentemente nella migrazione post riproduttiva (agosto e settembre). ●Note nidificazione: - (Laddaga L., Casale F., 2014) giugno 2013 femm. con 6 pulli Palude Brabbia (L.Laddaga). - (Ornitho) 13/06/2009 &gt; 8 indd. (femm. con pulli) Palude Brabbia (A.Prestileo), 11/08/2001 8 indd. (adulti con pulli) Palude Brabbia (L.Colombo). - (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 è risultata nidificare con certezza nel 2003 sulle sponde del Lago di Varese e nel periodo della ricerca probabilmente anche all' interno della Palude Brabbia. - (Guenzani &amp; Saporetti, 1988) rinvenuta nidificante in Palude Brabbia, sia nel 1983 (4 pulli con adulti) che nel 1986 (3 pulli). - (Realini 1982) "intorno al 1980, una colonia di sette - otto coppie sostò a nidificare in maggio nei prati confinanti con la Palude Brabbia sotto Inarzo" (L.Ghiringhelli rif.).</p>	C	2013
21	<p>Mestolone <i>Anas clypeata</i></p>	M W Bst	Poco freq.	<p>- Principalmente osservato durante la migrazione primaverile (marzo aprile), meno frequentemente nella migrazione post riproduttiva e nei mesi invernali. - (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, censito in 3 anni su 25: 2007 2 indd. Palude Brabbia, 1999 1 ind. Palude Brabbia, 1999 1 ind. Lago Maggiore, 1993 1 ind. Lago di Lugano. - (Tosi &amp; Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000 : osservazioni numericamente significative il 24/03/1997 205 indd. Lago di Comabbio e 22/03/1999 157 indd. Lago di Varese. ●Note nidificazione: - (Realini 1982) 10/06/1978, prima e unica segnalazione della provincia, avvistamento dei piccoli (E. Zanon) nei pressi dell'Isola di Virginia Lago di Varese.</p>	B	1978

Nr	<p>LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p>Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>	<p>Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p>Freq. oss.</p>	<p>NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p>NID. GR.</p>	<p>NID. Ult. anno nidif. certa</p>
22	<p>Fistione turco <i>Netta rufina</i></p>	M W B	Poco freq.	<p>- Punte massime delle osservazioni mesi di marzo, aprile e agosto. - (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, risulta l' anatra svernante più rara della provincia di Varese, 1991 1 ind. fiume Ticino, nessun individuo censito nel corso degli IWC 1998-2010. ●Note nidificazione: - (G.I.O.) Le recenti segnalazioni di adulti con pulli sono relative a Lago Maggiore e Lago di Varese. - (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie viene indicata come nidificante sul Lago di Varese dal 1998 sino al 2004 con un numero di coppie variabile da 1 a 4.</p>	C	2016
23	<p>Moriglione <i>Aythya ferina</i></p>	M W B	Freq.	<p>- Osservazioni in tutti i mesi dell'anno con punte massime nel periodo autunnale e invernale. - (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, con l' eccezione del Lago di Comabbio e della Palude Brabbia è risultato discretamente diffuso nel corso dei censimenti IWC. Dalle poche decine di indd. censiti a partire dal 1987 si è arrivati con ampie fluttuazioni ai 334 indd. nel 2007. Ricontrata diminuzione nell' ultimo biennio 2009-2010. ●Note nidificazione: - Le recenti nidificazioni riscontrate sono relative alle Vasche Arnetta di Lonate Pozzolo. - (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 osservata a fine luglio 2003 una femmina con due pulli alla foce del fiume Bardello sul Lago Maggiore. - (Realini 1982) "a partire dal 1975 una coppia ha nidificato regolarmente nella Palude Brabbia. Nel 1977 sarebbero nati 7 piccoli; dieci nel 1978" (L.Ghiringhelli rif.).</p>	C	2017
24	<p>Moretta dal collare <i>Aythya collaris</i></p>	A1 (1)	Molto rara	<p>- (EBN/an2007) dal 24/12/2006 al 24/04/2007 1 ind. Vasche dell'Arnetta Lonate Pozzolo (C.Dell'Acqua, A.Turri et al.).</p>		
25	<p>Moretta tabaccata <i>Aythya nyroca</i></p>	M W S B	Freq.	<p>- Specie essenzialmente migratrice, qualche individuo si ferma tutto l' anno nelle zone umide della provincia, in particolare Palude Brabbia e Lago di Varese. Punte massime di osservazioni mesi marzo e aprile. - (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, censita la prima volta nel 1998 1 ind. Lago Maggiore, 2001 1 ind. Lago Maggiore, 2002 5 indd. Lago di Varese, dal 2003 al 2006 3 indd. Palude Brabbia, 2007 3 indd. Lago di Varese, 2008 1 ind. Lago di Varese. ●Note nidificazione: - (Clarizio et al., 1991) la prima riproduzione accertata in Lombardia risale agli inizi degli anni 90' in Palude Brabbia.</p>	C	2017
26	<p>Moretta <i>Aythya fuligula</i></p>	M W B	Freq.	<p>- Osservazioni in tutti i mesi dell'anno con punte massime nel periodo novembre-marzo. - (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, tendenza crescente nei 25 anni di censimento, si raggiunge il massimo nel 2006 con 482 indd. per calare a circa 200 nel biennio 2009-2010. ●Note nidificazione: - Le recenti nidificazioni riscontrate sono relative alle Vasche Arnetta di Lonate Pozzolo. - (EBN/IT) 15/06/2002 osservata femm. ad. con 7 pulli Palude Brabbia (P.Casali). - (Realini 1982) agosto 1978 osservata presenza di giovani Lago di Varese (E. Zanon), maggio 1980 avvistamento 5 piccoli Lago di Comabbio (S. Moalli).</p>	F	2017

Nr	<p>LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p>Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>	<p>Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p>Freq. oss.</p>	<p>NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p>NID. GR.</p>	<p>NID. Ult. anno nidif. certa</p>
27	<p>Moretta grigia <i>Aythya marila</i></p>	M Wirr	Rara	<p>- (Ornitho) osservazioni: gen feb mar 2017, feb dic 2013, gen nov 2006, gen 2005 max 6 indd. (oss.vari). - (EBN/BL) 28-29/12/2013 4-6 indd. Ispra (P.Bonvicini L.Marocchi et al.), 20/01/2008 3 indd. Sesto Calende (A.Nicoli), 4/12/2007 4 indd. fiume Ticino Golasecca (A.Nicoli), 9/03/2007 1 ind. Lago di Varese (P. e L. Casali). - (A.Viganò rif.) 21/03/2005 3 indd. Lago di Varese, 12/03/2000 5 indd. Lago Maggiore. - (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010 : 1994 e 1998 1 ind. Lago di Ganna, 1995 3 indd. Lago di Lugano, 1997 e 2002 1 ind. Lago di Lugano, 2002 10 indd. Lago Maggiore (N.d.R. in Saporetti &amp; Carabella è erroneamente indicato Lago Varese). - (F.Casale rif.) 1-2 indd. a Somma lombardo: feb 1982, feb 1986, mar 1987, gen feb dic 1988. - (Bianchi et al. 1973) definita invernale di comparsa accidentale e irregolare, segnalazioni anni: 1968,1963,1954,1951,1948,1937,1933.</p>		
28	<p>Edredone <i>Somateria mollissima</i></p>	A7 (4)	Molto rara	<p>- (EBN/an2008) 21/09/2008 1 ind. Germignaga (O.Brambilla). - (EBN/an2006) 17/11/2006 1 ind. m. Brusimpiano (P.Casali, L.Marocchi). - (Casale 2015) 23/09/2002 2 indd. fiume Ticino Somma Lombardo (F.Casale, A.Genoni). - (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010 : Anni 1991 1993 1994 1995 1996 2001 2003 1 ind. f. Lago di Lugano (sempre lo stesso soggetto, probabile origine aufuga). - (Bianchi et al. 1973) definito accidentale e rarissimo, segnalazioni documentate: 4/10/1968 1 ind. catturato a Lisanza, nov. 1922 2 indd. insediati da alcuni cacciatori a Sesto Calende , mar. 1912 1 ind. catturato tra Lisanza e Arona.</p>		
29	<p>Moretta codona <i>Clangula hyemalis</i></p>	A10 (1)	Molto rara	<p>- (Ornitho) dal 7 al 24/12/2013 1 ind. m. Brebbia/Besozzo Lago Maggiore (M.Carabella, L.Colombo et al.). - (Tosi &amp; Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: 28/03/1999 1 ind. Lago Maggiore, dal 23/11 al 11/12/1998 3 indd. laghi Comabbio e Varese, 12/03/1997 1 ind. Lago Lugano. - (Fornasari et al.,1992) (R.Lardelli) citate generiche osservazioni ed indizi di svernamento laghi Verbano, Ceresio e Varese. - (Bianchi et al. 1973) definita accidentale rara sui laghi della provincia, 22/12/1967 5 indd. (2m e 3f) catturati a Lisanza, 2/02/1963 3 indd. Reno Lago Maggiore, dic. 1956 2 indd. Ranco Lago Maggiore, 26/04/1936 2 indd. Lisanza, 24/12/1931 1 ind. Lago di Varese, nov. 1901 1 ind. fiume Ticino.</p>		
30	<p>Orchetto marino <i>Melanitta nigra</i></p>	M Wirr	Poco freq.	<p>- Osservazioni in particolare Lago Maggiore in numero sempre limitato di indd., periodo dicembre/marzo. - (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, censita solo in tre anni su 25 e quasi esclusivamente sul Lago Maggiore max 3 indd. , anni: 2008, 2006, 2002. - (EBN/an2007) 2/12/2007 al 27/02/2008 2-3 indd. Sesto Calende (A.Nicoli, A.Turri et al.). - (EBN/an2006) 26/03/2006 1 ind. Ispra (E.Giussani), 8/01/2006 Sesto Calende (F.Luoni, A.Viganò). - (EBN/an2005) dal 8 al 28/12/2005 1 ind. Lisanza (E.Giussani, G.Crosta et al.). - (Bianchi et al. 1973) specie definita rara o scarsa, segnalazioni anni: 1968,1967,1954,1932,1930,1898,1887.</p>		
31	<p>Orco marino <i>Melanitta fusca</i></p>	M W	Poco freq.	<p>- Specie osservata quasi esclusivamente nei mesi invernali in particolare sud Lago Maggiore e meno frequentemente Lago di Varese (numero massimo indd. osservati 28). - (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010 : censito inizialmente nel 1995 diviene regolarmente svernante nel decennio 2000-2010 sul Lago Maggiore e in misura minore e più sporadicamente sul Lago di Varese. - (Tosi &amp; Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000 : da nov. 1997 a mar. 1998 3-6 indd. Lago di Varese, 10/12/1998 7 indd. Lago Maggiore, 9/01/2000 3 indd. Lago Maggiore.</p>		

Nr	<p>LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p>Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>	<p>Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p>Freq. oss.</p>	<p>NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p>NID. GR.</p>	<p>NID. Ult. anno nidif. certa</p>
32	<p>Quattrocchi <i>Bucephala clangula</i></p>	M W	Poco freq.	<p>- Osservazioni solitamente nei mesi invernali, in particolare Lago Maggiore e Lago di Varese. Numero max individui osservati: IWC 15/01/2017 15 indd. Lago di Varese (L.Giussani, R.Aletti et al.). - (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010 : specie rara ma costante sino al 2004. Presente in particolare sul fiume Ticino e osservata alcuni anni sui laghi Maggiore, Lugano e Varese.</p>		
33	<p>Pesciaiola <i>Mergellus albellus</i></p>	M	Rara	<p>- (Ornitho) 29/11/2014 2 indd. Angera Lago Maggiore (F.Saporetti, A.Vidolini, D.Casola), 9/05/2014 1 ind. f. Gorla Minore (P.Monti), 5/01/2002 3 indd. Sesto Calende (L.Giussani). - (EBN/BL) 25/01/2006 1 ind. m. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (L.Stefanazzi). - (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010 : 2002 1 ind. Lago di Varese, 1991 1 ind. fiume Ticino. - (Tosi &amp; Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000 : 17/12/1999 1 ind. foce canale Brabbia Lago di Varese. - (A.Viganò rif.) dal 18/11/1997 al 22/12/1997 1 ind. fiume Ticino, 14/02/1997 1 ind. fiume Ticino. - (Fornasari et al., 1992) (R.Lardelli) gen. 1990 1 ind. fiume Ticino nei pressi di Sesto Calende (INBS in verbis), gen. 1987 1 ind. Lago Maggiore. - (Bianchi et al. 1973) definita assai scarsa, segnalazioni Fiume Ticino Laghi Maggiore e Varese: 1967 1963 1955 1957 1950 1944 1929.</p>		
34	<p>Smergo minore <i>Mergus serrator</i></p>	M W	Poco freq.	<p>- La quasi totalità delle osservazioni è relativa al Lago Maggiore nel periodo invernale, indd. isolati o gruppetti di pochi individui. - (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti IWC 1986-2010: Lago Maggiore 3 indd. anni 2000 e 2008 e 1 ind. anni 2002 2007 2010 - Lago di Varese 1 ind. anno 2001 - fiume Ticino 1 ind. anno 2002. - (Bianchi et al. 1973) viene segnalato di comparsa regolare e relativamente frequente sul Lago Maggiore, sugli altri laghi scarso e con frequenza irregolare.</p>		
35	<p>Smergo maggiore <i>Mergus merganser</i></p>	S B M W	Freq.	<p>- Specie di recente immigrazione, sedentaria solo parzialmente in particolare Lago Maggiore. - (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, a partire dall' anno 2000 con alcune fluttuazioni si registra una crescente progressione numerica (max 41 indd. Nel 2008). - Dal 2010 la popolazione è monitorata con il «Progetto Smergo» in tutti i maggiori laghi e fiumi del Nord Italia, dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia. I rilievi, coordinati per la provincia di Varese dal GIO ed effettuati lungo la sponda lombarda del Lago Maggiore e sui fiumi Tresa e Margorabbia, sono condotti nei mesi di aprile (per rilevare le coppie potenziali) e in giugno (per contare le covate).</p>	C	2017
36	<p>Gobbo della Giamaica <i>Oxyura jamaicensis</i></p>	A4 (4)	Molto rara	<p>- (EBN/an2007) 6/04/2007 1 ind. f. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (C.Dell'Acqua, A.Turri et al.). - (EBN/an2006) dal 29/10/2006 al 19/11/2006 1 ind. f. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (C.Dell'Acqua, A.Turri et al.). - (Ornitho-EBN/an2005) dal 14/10/2005 al 24/12/2005 1 ind. f. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (P.Alberti et al.), dal 1/01/2005 al 11/03/2005 2 indd. f. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (C.Dell'Acqua, A.Giusto, M.Viganò et al.).</p>		
37	<p>Gobbo rugginoso <i>Oxyura leucocephala</i></p>	Ast3	Stor.	<p>- (Bianchi et al. 1973) Mar. 1971 1 ind. f. catturato a Ranco (Realini F. rif.), 22/09/1960 1 ind. Lago Maggiore tra Ispra e Belgirate (Realini F. rif.), 3/01/1934 1 ind. osservato a Lisanza (R.I.O. 1934, 82, Belfanti).</p>		

Nr	LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017  Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia		Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.	Freq. oss.	NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE	NID. GR.	NID. Ult. anno nidif. certa
<b>GALLIFORMES</b> <b>TETRAONIDAE</b>							
38	Francolino di monte	<i>Bonasa bonasia</i>	Sst	Stor.	- Specie sedentaria non piu' contattata dopo l' anno 2000. - (Tosi & Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000 : alto Luinese, indagine effettuata mediante l'impiego di richiamo acustico, anni 1999-2000 censito 1 ind. m.ad. - (Realini 1988b) "Presente in alta Val Molinera sino al 1974" (A.A.V.V. 1984).		
39	Fagiano di monte	<i>Tetrao tetrix</i>	S B? Bst	Poco freq.	- (A.Gagliardi rif.) Censimenti effettuati nella zona settentrionale della provincia: (a cura C.A.N.V.) 2015 24 indd. (17m 7f), 2014 20 indd. (16m 4f), 2013 9 indd. (9m). (a cura Univ. Studi Insubria/C.A.N.V.) 11/05/2012 20 indd. (16m 4f), 12/05/2011 21 indd. (16m 5f). - (Gagliardi et al. 2007) censimenti anni 2005 e 2006 relativi alla fascia territoriale montana - subalpina al confine con la Svizzera: 2005 11 indd. m. in 4 arene di canto, 2006 12 indd. m. in 6 arene di canto. - (Tosi & Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000 comprensorio alpino Nord Verbano conteggi : 1997 27 indd., 1998 16 indd., 1999 22 indd., 2000 23 indd. - (Brichetti & Fasola 1990) nel 1983 censite nel territorio provinciale 9 arene e 13 maschi (P.Brighetti). ●Note nidificazione: - (Realini 1988b) Stimate 5-6 nidiate annue tra Val Veddasca e alta Val Dumentina, con popolazione regolare e costante (A.A.V.V. 1984). - (Realini 1982) "Il sig. A.Provini stima una decine di coppie nidificanti, ripartite tra Forcora e Lema". - (Bianchi et al. 1973) segnala l'osservazione di un abitante di Marchirolo che nella primavera del 1951 scopri e seguì nella crescita una coppia con 8 piccoli nella zona di San Paolo in Colma a circa 1000 mt di altezza.	A	1984
<b>GALLIFORMES</b> <b>PHASIANIDAE</b>							
40	Colino della Virginia	<i>Colinus virginianus</i>	S B Int	Poco freq.	- Specie introdotta a scopo venatorio intorno agli anni 80' del secolo scorso. ●Note nidificazione: - (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 risulta stabilmente insediata nella porzione meridionale della provincia, valle del Ticino confinante con la provincia di Milano e brughiera residua a sud della Malpensa.	C	2017
41	Coturnice orientale	<i>Alectoris chukar</i>	S Rip	Rara	- Le poche osservazioni si riferiscono a individui ripopolati a scopo venatorio di cui non si hanno notizie di nidificazione.		
42	Coturnice	<i>Alectoris graeca</i>	S B	Rara	- (A.Gagliardi rif.) Censimento a cura del Comprensorio Alpino Nord Verbano : 9/05/2010 5 indd. - (Tosi & Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000 : Comprensorio Alpino Nord Verbano conteggi : 1997 0 indd., 1998 5 indd., 1999 9 indd., 2000 6 indd. - (Realini 1982) "Un tempo diffusa un pò dovunque sulle nostre montagne più alte, ora ridotta a pochi soggetti autoctoni, accanto ad esemplari recentemente importati dal Trentino e alla Chukar". - (A.Viganò rif.) inverno 1977 3 indd. monte Campo dei Fiori Tre Croci (oss. Aldo Viganò). - (Bianchi et al. 1973) confinata in località ristrette ed impervie della dorsale del Campo dei Fiori, del Piambello, della Valtravaglia e dell' Alta Val Veddasca. Dai registri di caccia del Parroco di Montegrino Don Giulio Moroni redatti dal 1847 al 1893 risultava assai abbondante negli alpeggi di Maccagno, Val Veddasca e Sasso Galletto. ●Note nidificazione: - (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 la presenza risulta stabile nell'area più settentrionale della provincia con un numero di coppie non superiore alla decina. - (Brichetti, Cambi 1983) per quanto riguarda la provincia di Varese il numero delle coppie superstiti viene definito irrilevante.	E	2005

Nr	<p style="text-align: center;">LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p style="text-align: center;">Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>		<p style="text-align: center;">Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p style="text-align: center;">Freq. oss.</p>	<p style="text-align: center;">NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">NID. GR.</p>	<p style="text-align: center;">NID. Ult. anno nidif. certa</p>
43	Pernice rossa	<i>Alectoris rufa</i>	S Rip	Rara	- Le osservazioni si riferiscono a individui ripopolati a scopo venatorio di cui non si hanno notizie di nidificazione nel territorio provinciale.		
44	Starna	<i>Perdix perdix</i>	S Bst Rip	Rara	<p>- Specie occasionalmente presente per introduzione a scopi venatori.</p> <p>- (Realini 1994) segnala, le uniche coppie indigene confinate in zone di silenzio venatorio nel basso Varesotto.</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>- (Realini 1979) - Primavera 1978: nidificazioni di 4 coppie su 5 immesse. "Eppure solo qualche decennio fa il sig. Achille Moretti censì più di 100 coppie indigene nidificanti nella sola zona di Caronno Pertusello".</p>	B	1978
45	Quaglia	<i>Coturnix coturnix</i>	M B? Bst	Poco freq.	<p>- Solitamente individuabile dal richiamo emesso, in particolare nei mesi di maggio e giugno.</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>- (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie è stata censita soprattutto nell'area meridionale della provincia in aree pianeggianti normalmente inferiori ai 300 mt, solo segnalazioni isolate nella porzione settentrionale e centrale. Nel periodo di ricerca solo dati di nidificazione probabile.</p> <p>- (Guenzani &amp; Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 nidificazione certa in 1 tavoletta IGM 1:25.000 nel settore meridionale della provincia.</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) segnala nel decennio 1950-1960 nella zona della Malpensa e della Valcuvia il ritrovamento di alcuni nidi (4 - 8 uova) in agosto e persino nella prima decade di settembre.</p>	A	1987
46	Fagiano comune	<i>Phasianus colchicus</i>	S B Rip	Freq.		C	2012
<b>GAVIIFORMES</b>		<b>GAVIIDAE</b>					
47	Strolaga minore	<i>Gavia stellata</i>	M Wirr	Poco freq.	<p>- Le osservazioni sono relative al Lago Maggiore e Lago di Varese nel periodo invernale e di inizio primavera.</p> <p>- (Ornitho) elevato numero di individui osservati il 23/04/2006 18 indd. Porto Valtravaglia Lago Maggiore (M.Viganò).</p> <p>- (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010 : Lago Maggiore 2 indd. anno 1986 e 1 ind. anni 1989 1994 1995 1996, Lago di Lugano 1 ind. anno 1994.</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) "E' la specie circumpolare più comune sui nostri laghi".</p>		
48	Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>	M W	Poco freq.	<p>- Le osservazioni sono relative al Lago Maggiore e Lago di Varese nel periodo invernale e di inizio primavera.</p> <p>- (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010 : viene definita una specie censita regolarmente ma sempre con effettivi scarsi.</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) "Questa specie è presente quasi tutti gli anni nei mesi invernali ed anche in primavera".</p>		



Nr	<p>LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p>Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>	<p>Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p>Freq. oss.</p>	<p>NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p>NID. GR.</p>	<p>NID. Ult. anno nidif. certa</p>
49	<p>Strolaga maggiore <i>Gavia immer</i></p>	A9 (5)	Molto rara	<p>- (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010: anno 2008 1 ind. Lago Maggiore. - (Ornitho) 13/01/2007 1 ind. Porto Valtravaglia (M.Viganò), dal 2/04/2006 al 23/04/2006 1 ind. Porto Valtravaglia (M.Viganò). - (EBN/an2006) 26/03/2006 1 ind. Ispra (E.Giussani). - (Casale 2015) 4/01/2006 1 ind. loc. Porto della Torre - Somma Lombardo (A.Turri). - (Tosi &amp; Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000 : mag.1997 1 ind. Lago Maggiore. - (Martorelli 1960) 6/12/1930 1 ind. ucciso a Porto Valtravaglia Lago Maggiore, 5/06/1926 1 ind. m. juv catturato a Laveno Lago Maggiore (Moltoni, Natura, vol. XVII 1926, 101) , 1867 1 ind. juv ucciso sul Lago di Varese e donato al Museo di Milano.</p>		
<p>PELECANIFORMES PELECANIDAE</p>						
50	<p>Pellicano comune <i>Pelecanus onocrotalus</i></p>	A7 (5)	Molto rara	<p>- (Ornitho) dal 12/09/2013 al 13/10/2013 quasi certamente sempre lo stesso individuo osservato tra il Lago di Varese e il Lago Maggiore (A.Nicoli et al.), dal 22/03/2013 al 22/04/2013 1 ind. Palude Brabbia (A.Martinoli L.Laddaga et al.), 13/06/2012 5 indd. Cazzago Brabbia (A.Martinoli, L.Laddaga), 20/04/2011 1 ind. garzaia Casale Litta (A.Martinoli). - (EBN/BL) gen. 2006 1 ind. Lisanza (anonimo tramite F.Luoni). - (Bianchi et al. 1973) definito accidentale sino all'inizio del secolo scorso: 14/06/1902 1 ind. catturato sul Lago Maggiore (da Ghidini-Avicula 1902, n. 59-60, pag. 63). - (Monti 1845) in riferimento al Lago di Varese riporta: 21/07/1831 comparvero otto pellicani e che uno ne fu ucciso.</p>		
51	<p>Pellicano riccio <i>Pelecanus crispus</i></p>	A4 (4)	Molto rara	<p>- Non si può escludere la possibile origine aufuga dei soggetti osservati. - (Ornitho) 14/08/2015 1 ind. Fiume Ticino Somma Lombardo (I.Gabasio), 2/08/2014 2 indd. Angera Lago Maggiore (L.Andena), da ott. 2003 a feb. 2005 1 ind. Lonate Pozzolo (L.Giussani / si presume lo stesso individuo nei 3 anni). - (Longoni et al. 2010) Gennaio 2010, 2 indd. Lago Maggiore tratto 5 tra Ispra e Sesto Calende (censimento IWC).</p>		
<p>PELECANIFORMES PHALACROCORACIDAE</p>						
52	<p>Cormorano <i>Phalacrocorax carbo</i></p>	M W S B	Molto freq.	<p>- Specie migratrice e sedentaria solo parzialmente, in notevole aumento residenti e migratori. - A livello provinciale numero massimo indd. censiti 1242 (IWC gennaio 2012). - (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010: a partire dagli anni '90 del secolo scorso, in forte aumento come svernante, con max 2656 indd. (2007) nel conteggio annuale; in media 1400 indd.</p>	C	2016
53	<p>Marangone minore <i>Phalacrocorax pygmeus</i></p>	A3 (1)	Molto rara	<p>- (EBN/an2014) 10/09/2014 1 ind. Gorla Minore (P.Monti). - (Bianchi E., 1962) Lago di Varese, gruppo di 7 indd. di cui 3 catturati "anni orsono" (anni 50' ?) più un'altra cattura di 1 ind. maschio in epoca non meglio definita.</p>		

Nr	<p>LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p>Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>	<p>Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p>Freq. oss.</p>	<p>NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p>NID. GR.</p>	<p>NID. Ult. anno nidif. certa</p>
	<p>CICONIIFORMES      ARDEIDAE</p>					
54	<p>Tarabuso      <i>Botaurus stellaris</i></p>	M W B? Bst	Poco freq.	<p>- Le osservazioni più frequenti sono relative al periodo novembre-aprile. - (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, censito a partire dall' anno 2000 sul Lago di Varese, tra il 2006 e il 2008 8-12 indd. Lago di Varese, 2003 1 ind. fiume Ticino, 2002 2 indd. Palude Brabbia, 2005 e 2006 1 ind. Palude Brabbia. ●Note nidificazione: - (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 l' unica segnalazione di nidificazione probabile si riferisce all'osservazione di un individuo avvistato per almeno una settimana alla fine di aprile 2005 nella Palude Brabbia. - (Bianchi et al. 1973) segnala due casi di nidificazione nel 1966 e 1967, "i nidi furono trovati nei canneti tra la Bozza di Monvalle e la riva del "Saresone" alla fine di maggio".</p>	A	1967
55	<p>Tarabusino      <i>Ixobrychus minutus</i></p>	M B	Poco freq.	<p>- Presente nel periodo primaverile-estivo.</p>	C	2017
56	<p>Nitticora      <i>Nycticorax nycticorax</i></p>	M B	Freq.	<p>- La quasi totalità delle osservazioni è relativa al periodo da marzo a settembre, con punte massime nei mesi di maggio e giugno con particolare riferimento agli individui estivi e nidificanti. ●Note nidificazione: - Le recenti nidificazioni sono quasi tutte relative alla Palude Brabbia.</p>	C	2017
57	<p>Sgarza ciuffetto      <i>Ardeola ralloides</i></p>	M	Rara	<p>- Quasi sempre indd. isolati in spostamento migratorio nel periodo da aprile a agosto. - (Bianchi et al. 1973) definita di passo, molto rara, segnalazione anni: 1937.</p>		
58	<p>Airone guardabuoi      <i>Bubulcus ibis</i></p>	M Wirr	Poco freq.	<p>- Stanziale in province limitrofe, migratore a corto raggio e areale in espansione.</p>		
59	<p>Garzetta      <i>Egretta garzetta</i></p>	M W B	Freq.	<p>- Più frequentemente osservata nei periodi aprile-maggio e agosto-ottobre. - (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, anni 2001 2007 2009 censiti pochissimi indd. sul Lago Maggiore, nr. max censito 2007 6 indd. fiume Ticino, 2008 1 ind. Lago di Varese. ●Note nidificazione: - (Banca dati Gruppo Garzaie Italia) Garzaia della Maddalena Somma Lombardo anni: 2014 9 nidi, 2013 6 coppie nidif., 2012 5 nidi, 2011 5 nidi, 2009 24 coppie nidif.. Garzaia Palude Brabbia : anno 2011 nidif. di 1 coppia. - (Bianchi et al. 1973) Oltre 40 - 50 coppie nidificano lungo la vallata del Ticino, altre piccole colonie sono poste a nord del ponte di Oleggio sino alle dighe di Porto della Torre (Somma Lombardo).</p>	F	2014
60	<p>Airone bianco maggiore      <i>Egretta alba</i></p>	M W	Freq.	<p>- Specie in netta espansione dall' inizio di questo secolo come svernante in provincia, legata in particolare alle zone umide. - A livello provinciale numero massimo indd. censiti 74 (IWC gennaio 2017). - (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, prima oss. nel 2000 con 1 ind., picco di 53 indd. nel 2007 sul fiume Ticino.</p>		

Nr	<p style="text-align: center;">LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p style="text-align: center;">Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>		<p style="text-align: center;">Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p style="text-align: center;">Freq. oss.</p>	<p style="text-align: center;">NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">NID. GR.</p>	<p style="text-align: center;">NID. Ult. anno nidif. certa</p>
61	Airone cenerino	<i>Ardea cinerea</i>	S B M W	Molto freq.	<p>- In aumento la popolazione residente.</p> <p>- A livello provinciale numero massimo indd. censiti 171 (IWC gennaio 2017).</p> <p>- (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, tra il 1995 e il 2005 valore medio censito 49 indd., valore max nel 2006 con 142 indd., sino ad arrivare ai 67 indd. del 2010. Maggiori presenze su laghi Maggiore e Varese.</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>- Principali nidificazioni nelle garzaie della Palude Brabbia, Calciate Lago di Varese, Monvalle Lago Maggiore.</p>	C	2017
62	Airone rosso	<i>Ardea purpurea</i>	M B	Freq.	<p>- Periodo di maggior presenza da marzo a settembre.</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>- Le ultime nidificazioni riscontrate sono relative alle garzaie della Palude Brabbia e di Calciate Lago di Varese.</p>	C	2014
<i>CICONIIFORMES</i>		<i>CICONIIDAE</i>					
63	Cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>	M	Rara	<p>- (Ornitho) 28/03/2017 1 ind. Monte Cadrigna Maccagno (F.Saporetti) e 1 ind. Cassano Valcuvia in diverso orario e diversa direzione (M.Soldarini), 8/05/2016 1 ind. Luino (M.Viganò), 21/04/2016 1 ind. in migrazione Monte Cuvignone Cittiglio (M.Viganò), 6/04/2015 1 ind. Lonate Pozzolo (W.Guenzani, L.Colombo), 30/07/2014 1 ind. Buguggiate (S.Baratelli), 18/09/2013 2 indd. Lozza (L.Laddaga), 4/04/2008 1 ind. Ternate (L.Giussani), 13/05/2007 1 ind. Rancio Valcuvia (M.Carabella, F.Pianezza).</p> <p>- (EBN/BL) 18/05/2013 1 ind. Ternate (L.Giussani), 26/03/2010 1 ind. Germignaga (M.Viganò), 16/04/2008 1 ind. Morosolo (L.Marocchi).</p> <p>- (M.Carabella, F. Pianezza rif.) apr. 2008 1 ind. Rancio Valcuvia.</p> <p>- (Bordignon 2005) 9/11/2005 1 ind. trovato morto per collisione cavi elettrici a Cittiglio.</p> <p>- (EBN/IT) 6/06/2004 1 ind. loc. Campo dei Fiori, osservato dal Forte di Orino (P &amp; L. Casali).</p> <p>- (F.Casale rif.) 12/09/1989 2 indd. Somma Lombardo.</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) 14/10/1961 1 ind. loc. "Lagheti" Cocquio Trevisago.</p>		
64	Cicogna bianca	<i>Ciconia ciconia</i>	M	Rara	<p>- Poche le segnalazioni, osservata in particolare nei mesi primaverili.</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>- La segnalazione della nidificazione di una coppia negli anni 2015 e 2016 nei pressi dell'Agriturismo Cascina Gaggio di Besnate (rif. V.Uboldi proprietario dell'agriturismo) è pervenuta solo nel 2017 e non è stato possibile alcun riscontro (non considerata).</p> <p>- Un tentativo di nidificazione è stato effettuato da una coppia nella primavera 2008 in località Schiranna Lago di Varese senza alcun risultato positivo.</p>		
<i>CICONIIFORMES</i>		<i>THRESKIORNITHIDAE</i>					
65	Mignattaio	<i>Plegadis falcinellus</i>	Ast3	Stor.	<p>- (Laddaga L., Casale F., 2014) fine anni '90 3 indd. osservati e fotografati presso Fosso di Mezzo Palude Brabbia (A. Bottelli rif.).</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) definito di passo, molto raro.</p> <p>Lago Maggiore 2 osservazioni tra Lisanza e Sesto Calende: mar. 1932 1 ind., ott. 1927 1 ind.</p>		

Nr	<p>LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p>Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>	<p>Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p>Freq. oss.</p>	<p>NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p>NID. GR.</p>	<p>NID. Ult. anno nidif. certa</p>
66	<p>Ibis sacro <i>Threskiornis aethiopicus</i></p>	M Int	Rara	<p>- Probabile che i soggetti osservati siano provenienti da province vicine (VC NO) dove la specie ha formato una popolazione stabile residente (prima nidificazione nel 1989 in provincia di VC). La specie e' comunque in espansione territoriale e non si possono escludere movimenti migratori a corto raggio. - (Ornitho) interessante osservazione per elevato numero di individui: 29/11/2015 60 indd. in volo direzione nord Laveno Mombello (M.Carabella et al.).</p>		
67	<p>Spatola <i>Platalea leucorodia</i></p>	A4 (3)	Molto rara	<p>- (Ornitho) 16/11/2014 1 ind. Brissago Valtravaglia (F.Saporetti), 9/03/2012 1 ind. Biandronno (F.Boggiani). - (M.Carabella, F.Pianezza rif.) 3/05/2005 1 ind. in volo Palude Brabbia. - (Giglioli 1889, 1890) 2/11/1887 1 ind. juv. ucciso nei pressi di Busto Arsizio (E.Bonomi).</p>		
<p>PHOENICOPTERIFORMES PHOENICOPTERIDAE</p>						
68	<p>Fenicottero <i>Phoenicopus roseus</i></p>	Ast3	Stor.	<p>- (A.Viganò rif.) 1 ind. juv. oss. tra 1997 e 2000 Lago Maggiore. - (Bianchi et al. 1973) definito accidentale, di passo. 3/11/1951 un indd. preso nella Palude Brabbia Lago di Varese (R.I.O. 1953,41), primavera 1914 12 indd. in volo sul Lago di Varese .</p>		
<p>PODICIPEDIFORMES PODICIPEDIDAE</p>						
69	<p>Tuffetto <i>Tachybaptus ruficollis</i></p>	S B M W	Freq.	<p>- (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, media censita periodo 2001-2010 143 indd., max assoluto Lago di Varese nel 2008 con 148 indd.</p>	C	2017
70	<p>Svasso maggiore <i>Podiceps cristatus</i></p>	S B M W	Molto freq.	<p>- A livello provinciale numero massimo indd. censiti 1742 (IWC gennaio 2013). - (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, uno degli acquatici svernanti più comune, numeri indd. censiti significativi e incrementi modesti, max censiti 3002 indd. anno 2006 equamente ripartiti tra Lago di Lugano e Maggiore, buone presenze indd. svernanti anche laghi di Monate e Varese.</p>	C	2017
71	<p>Svasso collaroso <i>Podiceps grisegena</i></p>	M Wirr	Poco freq.	<p>- La quasi totalità delle osservazioni è relativa al Lago Maggiore. Numero max individui osservati: 9/04/2006 5 indd. abito riproduttivo Porto Valtravaglia (M.Viganò/Ornitho). - (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010 : definita specie alquanto scarsa con costante e progressiva rarefazione nel corso dei 25 anni, dai valori massimi degli anni 1987 (22 indd.), 1989 (18 indd.), 1992 (15 indd.) dopo l' anno 1993 diventa sempre più scarso o assente. - (Bianchi et al. 1973) definito raro invernale e di passo, segnalazioni anni : 1968 1967 1956 1955 1942 1934 1929. Dalle cronache locali risulta che sul finire dell' Ottocento ed i primi del Novecento la specie era ancora discretamente abbondante. Riferisce che il passo fu particolarmente copioso negli anni: 1912,1907,1902,1895,1893,1887,1881.</p>		
72	<p>Svasso cornuto <i>Podiceps auritus</i></p>	M Wirr	Poco freq.	<p>- Le osservazioni sono tutte relative al Lago Maggiore e al Lago di Varese, periodo invernale e di inizio primavera. - (Tosi &amp; Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000 : 22/10/1999 1 ind. Lago Maggiore, 20/11/1999 2 indd. Lago Ceresio, dal 9/02/1999 al 13/03/1999 1 ind. Lago Varese. - (Bianchi et al. 1973) definita specie rara, catturata esclusivamente in dic.-gen. Segnalazioni anni: 1968,1967,1927?. - (Martorelli 1960) definita specie assai rara in Italia. 4/01/1930 1 ind. f. Lisanza Lago Maggiore (collez. Museo di Storia Naturale di Milano).</p>		

Nr	<p style="text-align: center;">LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p style="text-align: center;">Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>		<p style="text-align: center;">Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p style="text-align: center;">Freq. oss.</p>	<p style="text-align: center;">NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">NID. GR.</p>	<p style="text-align: center;">NID. Ult. anno nidif. certa</p>
73	Svasso piccolo	<i>Podiceps nigricollis</i>	M W B? Bst	Freq.	<p>- (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, svernante regolare con ampie fluttuazioni, maggiori concentrazioni: Lago di Lugano con medie di 101 indd. dopo l' anno 2005 , Lago di Varese con un max di 140 indd. nel 2008 e un calo nell' ultimo biennio (62 indd. 2009 e 39 indd. 2010), Lago Maggiore con una media di 20 indd./anno nell' ultimo decennio 2001/2010.</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>- (Realini 1984) 19 aprile 1981, nido con uova Lago di Varese (P. Zanetti) e 1982 nido con 1 uovo distrutto dalle piene primaverili.</p> <p>- (Realini 1982) 1980, permanenza di una coppia e successivo avvistamento nel mese di agosto di 3 piccoli (E. Zanon) foce canale Brabbia Lago di Varese.</p>	A	1982
<i>FALCONIFORMES</i>		<i>ACCIPITRIDAE</i>					
74	Falco pecchiaiolo	<i>Pernis apivorus</i>	M B	Freq.	- Punte massime delle osservazioni mesi di maggio e agosto.	C	2017
75	Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>	M B	Freq.	- La quasi totalità delle osservazioni è relativa al periodo da marzo a agosto, con punte massime nel mese di aprile e minime al mese di agosto quando gli individui che si sono fermati a estivare e nidificare iniziano la migrazione post riproduttiva.	C	2017
76	Nibbio reale	<i>Milvus milvus</i>	M Wrr Bst?	Poco freq.	<p>- Principalmente osservato nel periodo primaverile (marzo-maggio).</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) Definito non molto comune di passo, nidificante.</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>'- (Realini 1982) Si fa riferimento a due nidificazioni non verificate dagli autori: Poncione di Ganna nel 1974 (C.Croci) e Sasso della Nonna negli anni 1977-1979.</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) 20/04/1963 oss. 9 indd., di questi 4 indd. restarono nei boschi vicini sino al 15/07/1963. Opinione degli autori che nidificarono in zona.</p> <p>- La specie in questa Lista in relazione ai dati reperiti viene definita "nidificante certa storica" con qualche dubbio.</p>	B	1979?
77	Grifone	<i>Gyps fulvus</i>	A9 (9)	Molto rara	<p>- (Ornitho) 12/06/2017 8 indd. loc. Sass de Ferr Laveno Mombello (R.Tomasini), 11/06/2017 7 indd. Duno (R.De Ricco), 17/05/2017 2 indd. Cuvignone Cittiglio (C.Parnell), 8/11/2016 1 ind. in volo a Brissago (CH) direzione Luino (O.Ostinelli /Ornitho.ch), 14/05/2016 1 ind. Campo dei Fiori Varese (M.Carabella), 7/10/2015 1 ind. Valganna Varese (R.Talamona).</p> <p>- (EBN/BL) 4/08/2014 1 ind. Monte Campo dei Fiori Varese (E.Giussani), 25/04/2013 1 ind. Monte Martica Varese (A.Giusto et al.).</p> <p>- (C.Scandolaro rif.) 6/03/2010 1 ind. Monte Cadrigna Val Veddasca (foto ind. su traliccio).</p>		

Nr	<p style="text-align: center;">LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p style="text-align: center;">Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>	<p style="text-align: center;">Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p style="text-align: center;">Freq. oss.</p>	<p style="text-align: center;">NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">NID. GR.</p>	<p style="text-align: center;">NID. Ult. anno nidif. certa</p>
78	<p>Biancone <i>Circaetus gallicus</i></p>	M B	Poco freq.	<p>- Mesi di maggior presenza: marzo, aprile, settembre. - (Bianchi et al. 1973) definita di passo molto scarsa, segnalazioni anni: 1964,1962,1958,1934. ●Note nidificazione: - Dopo il 2009 si stimano 2-3 coppie nidificanti nel territorio provinciale. - (L. Colombo per Team Astor rif.) nidificazione di 1 coppia con l' involo dell'unico nato nel corso delle stagioni riproduttive 2014-2017 nella porzione centro-settentrionale della provincia. - (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie è stata segnalata solo 3 volte in ambiente idoneo in alta Val Veddasca e tra il Monte Campo dei Fiori e la Valganna, senza comunque alcuna prova di nidificazione certa. - (Saporetti et al. 1993) nidificazione accertata per il periodo 1987-1989 su pino silvestre; poi nel 1990-91 su altra pianta a 200 mt dal precedente, sempre su pino silvestre (Saporetti et al.). - (Guenzani &amp; Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 nidificante con una sola coppia nella parte settentrionale della provincia. - (Brichetti, Cambi 1980) tra gli areali di nidificazione in Lombardia viene segnalata anche la zona del Campo dei Fiori di Varese.</p>	F	2017
79	<p>Falco di palude <i>Circus aeruginosus</i></p>	M W B? Bst	Freq.	<p>- Punte massime delle osservazioni mesi di marzo e aprile. - (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, pochi indd. svernanti , 2001 2002 e 2005 1 ind. Palude Brabbia, 2010 1 ind. Lago Maggiore. ●Note nidificazione: - (A.Viganò rif.) Primav. 2001 1 ind. trasporto materiale per il nido a Biandronno (nidificazione probabile). - (G.I.O.) marzo/giugno 1999, osservata più volte la coppia trasportare cibo e materiale per il nido, località Arnetta Lonate Pozzolo (nidificazione probabile). - (Realini 1982) segnala nel 1977 la possibile nidificazione in Palude Brabbia. - (Brichetti, Cambi 1980) in riferimento alla regione Lombardia viene riportato: "..... un tempo stazionario e nidificante in modo generico nella regione (Prada 1877; Bettoni 1865) o più particolarmente nel Mantovano (Lanfossi 1835; Giglioli 1890) e nella Provincia di Varese (Palude Brabbia) (Cattaneo 1844).</p>	A	1844
80	<p>Albanella reale <i>Circus cyaneus</i></p>	M W	Poco freq.	<p>- Specie invernale, principali osservazioni nei mesi da novembre a marzo. - (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, nei 25 anni 1 solo indd. censito nel 2006 in Palude Brabbia.</p>		
81	<p>Albanella pallida <i>Circus macrourus</i></p>	A2 (2)	Molto rara	<p>- (Ornitho) 19/09/2015 1 ind. 1cy Ternate (L.Giussani), 1-3-6/05/2015 1 ind. tipo f. Aerop. Malpensa (S.Daverio). - (Bianchi et al. 1973) definita di passo, poco osservata e quasi sconosciuta. Vengono citate osservazioni individuali e generiche nei mesi da aprile a maggio nella zona di Golasecca.</p>		
82	<p>Albanella minore <i>Circus pygargus</i></p>	M Bst	Poco freq.	<p>- Osservata quasi esclusivamente nel periodo primaverile, scarse le osservazioni durante la migrazione post riproduttiva. ●Note nidificazione: - (Realini 1982) intorno all'anno 1970 rinvenuto nido con 4 uova posizionato a terra in una radura della Riserva di caccia La Maddalena a Lonate Pozzolo (rif. N.Casagrande).</p>	B	1970
83	<p>Astore <i>Accipiter gentilis</i></p>	S B M W	Poco freq.	<p>- Oltre alla popolazione sedentaria provinciale si possono aggiungere giovani in dispersione provenienti da altre zone e qualche migratore proveniente dal Nord Europa.</p>	C	2017

Nr	<p style="text-align: center;">LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p style="text-align: center;">Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>	<p style="text-align: center;">Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p style="text-align: center;">Freq. oss.</p>	<p style="text-align: center;">NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">NID. GR.</p>	<p style="text-align: center;">NID. Ult. anno nidif. certa</p>
84	Sparviere <i>Accipiter nisus</i>	S B M W	Freq.	- Alla popolazione locale si possono aggiungere durante il passo individui provenienti dall' Europa nord-occidentale.	C	2017
85	Poiana <i>Buteo buteo</i>	S B M W	Molto freq.	- Numero massimo delle osservazioni nei mesi di marzo aprile. Due segnalazioni relative alla ssp vulpinus Poiana delle steppe: 12/08/2017 1 ind. Veddasca (F.Saporetto, W.Guenzani/Ornitho), 2/04/2013 1 ind. Ternate (L.Giussani).	C	2017
86	Poiana codabianca <i>Buteo rufinus</i>	A2 (2)	Molto rara	- (Ornitho) 7/09/2016 1 ind. Ternate (L.Giussani). - (Bird Control Italy s.r.l. - Dip. di Biologia Università di Pisa apr. 2012) monitoraggio effettuato da lug 2007 a giu 2008 all' Aeroporto di Malpensa, oss. 1 ind. durante i rilievi del 22/05/2008 e del 5/06/2008, comuni Ferno-Samarate. - (Bianchi et al. 1973) citata sul territorio della provincia ma senza prove certe.		
87	Poiana calzata <i>Buteo lagopus</i>	Ast5	Stor.	- (Laddaga L., Casale F., 2014) terza decade ottobre 1995 1 ind. Palude Brabbia (Viganò A. dati ined.). - (Ferrari M. 1980) 2/01/1980 osservazione di una poiana calzata sulle colline di Cuvio. - (Bianchi et al. 1973) definita specie invernale, irregolare ma non del tutto rara, con variazioni annuali di densità. Uniche segnalazioni sicure documentate: 13/01/1963 1 ind. m. fase scura catturato a Ispra (coll. Martire), gen. 1963 1 ind. catturato a Ispra donato ad un collezionista sconosciuto, 9/02/1941 1 ind. Brusimpiano (R.I.O. 1941,129).		
88	Aquila anatraia maggiore <i>Aquila clanga</i>	Ast2	Stor.	- (Bianchi et al. 1973) Autunno 1946, 1 ind. fase chiara ucciso in località "Novaglia" Bodio-Galliate (Lago di Varese) e sempre nel 1946 altro individuo catturato tra Tradate e Valle Olona (soggetto visionato in carne presso un'armeria di Varese).		
89	Aquila anatraia minore <i>Aquila pomarina</i>	A1 (1)	Molto rara	- (EBN/an2011) 29/06/2011 1 ind. Cadrezzate (M.Piha).		
90	Aquila minore <i>Hieraetus pennatus</i>	M	Rara	- (Ornitho) 22/09/2017 1 ind. Lonate Pozzolo (F.Casale), 30/04/2014 1 ind. Lonate Pozzolo (A.Vidolini, P.Bonazzi), 4/04/2014 1 ind. Varano Borghi (L.Laddaga), 2/04/2013 1 ind. Ternate (L.Giussani), 24/04/2011 1 ind. morfismo scuro Casorate Sempione (A.Vidolini), 15/04/2005 1 ind. Biandronno (L.Giussani), 16/09/2004 6 indd. Besozzo e 2 indd. Biandronno (L.Giussani). - (Laddaga L., Casale F., 2014) 26/04/2012 1 ind. fase scura Palude Brabbia (L.Laddaga). - (EBN/an2006) 17/09/2006 1 ind. Palude Brabbia (F.Luoni, A.Galimberti). - (EBN/IT) 8/04/2001 1 ind. Palude Brabbia (P.Casali, L.Marocchi), 10/09/2000 1 ind. Palude Brabbia (O.Janni, R.Garavaglia, A.Nicoli, P.Casali et al.) - (Laddaga L., Casale F., 2014) 17/09/2000 1 ind. Palude Brabbia (Viganò A. dati ined.).		
91	Aquila reale <i>Aquila chrysaetos</i>	S B?	Poco freq.	- Le recenti osservazioni (post 2009), quasi tutte effettuate nella parte settentrionale della provincia, sono relative a soggetti di diverse classi di età. Molto probabile la presenza di alcuni individui erratici provenienti dalle Alpi, ma alcune ripetute e ravvicinate osservazioni post 2014 fanno pensare alla presenza stabile di qualche individuo nel territorio provinciale. ●Note nidificazione: - (G.I.O.) Alta provincia segnalazioni post 2013 (in particolare anni 2016 e 2017) di nidificazione probabile (ripetuta presenza di almeno una coppia nel periodo primaverile con comportamento territoriale e volo a festoni) ma nessuna conferma di nidificazione certa. Non si può quindi escludere che presenza e comportamenti siano da riferirsi a qualche coppia nidificante in Svizzera.	X	

LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017		Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.	Freq. oss.	NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE	NID. GR.	NID. Ult. anno nidif. certa
Nr	Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia					
92	Aquila imperiale <i>Aquila heliaca</i>	A2 (2)	Molto rara	- (Ornitho) 4/05/2017 1 ind. imm. Casorate Sempione (S.Daverio), 1/04/2017 1 ind. Castelvecchana (L.Nigro).		
<b>FALCONIFORMES</b> <b>PANDIONIDAE</b>						
93	Falco pescatore <i>Pandion haliaetus</i>	M B?	Poco freq.	- Le osservazioni in provincia sono concentrate soprattutto sul Lago di Varese, in Palude Brabbia e sul Lago Maggiore. Alcuni soggetti si fermano in zona anche diverse settimane in primavera e autunno. ●Note nidificazione: - (Ornitho) 15/05/2015 2 indd. Palude Brabbia (L.Colombo per conto di R.Glaviano che ha effettuato l'osservazione e documenta con foto la fase dell'accoppiamento - dato nidificazione probabile).	X	
<b>FALCONIFORMES</b> <b>FALCONIDAE</b>						
94	Grillaio <i>Falco naumanni</i>	A3 (2)	Molto rara	- (Ornitho) 5/04/2014 Ferno, 1 ind. fem.ad. morto per impatto con aereo, riconoscimento confermato da Malfatti Luigi (inanellatore) sulla base di dati morfometrici e immagini di dettaglio del piumaggio e delle zampe (S.Daverio), 9/04/2006 1 ind. Germignaga (M.Viganò). - (Moltoni E., 1949) 7/05/1937 1 ind. catturato nei dintorni Varese.		
95	Gheppio <i>Falco tinnunculus</i>	S B M W	Freq.	- Periodo con il maggior numero di osservazioni da marzo a giugno.	C	2017
96	Falco cuculo <i>Falco vespertinus</i>	M	Poco freq.	- (Bianchi et al. 1973) Definita specie di doppio passo, abbastanza comune, scarsa nella migrazione autunnale.		
97	Smeriglio <i>Falco columbarius</i>	M Wirr	Poco freq.	- Osservazioni principalmente nel periodo da gennaio a aprile e da ottobre a dicembre. - (Bianchi et al. 1973) definito di passo, scarso.		
98	Lodolaio <i>Falco subbuteo</i>	M B	Freq.	- Le osservazioni più frequenti sono relative ai mesi di aprile, maggio e settembre. ●Note nidificazione: - (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 vengono individuati due distinti gruppi riproduttivi: il primo nel settore centrale della provincia sezioni Lago di Varese e Sumirago e il secondo lungo l'asta del Ticino sezioni Vizzola Ticino e Lonate Pozzolo.	C	2017
99	Falco della Regina <i>Falco eleonora</i>	A1 (1)	Molto rara	- (Ornitho) 17/08/2017 1 ind. probabile 2cy Monte Cuvignone Cittiglio (L.Giussani, A.Pentassuglia, M.Bergomi).		
100	Sacro <i>Falco cherrug</i>	A1 (1)	Molto rara	- (EBN/BL) 31/08/2015 1 ind. con anello rinvenuto morto a Gerenzano (G.Pozzi). Hungarian Bird Ringing Centre conferma: ind. sesso maschile inanellato da pullo il 20/05/2015 a Debrecen, Hajdu-Bihar, Hungary [HG44].		
101	Falco pellegrino <i>Falco peregrinus</i>	S B M W	Poco freq.	- Possibile che qualche individuo proveniente dal Nord Europa durante la fase migratoria si aggiunga alla popolazione locale.	C	2017
<b>GRUIFORMES</b> <b>RALLIDAE</b>						
102	Porciglione <i>Rallus aquaticus</i>	S B M W	Freq.	- Specie di non sempre facile osservazione, solitamente individuabile dal verso. - (Saporetti & Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, incluso nei conteggi solo dai primi anni 2000 per la difficoltà di individuazione di questa specie, contattato prevalentemente sul Lago di Varese (max 61 indd. nel 2007) e in Palude Brabbia (max 18 indd. nel 2005), censito anche in alcuni canneti del Lago Maggiore.	C	2017



Nr	<p>LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p>Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>		<p>Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p>Freq. oss.</p>	<p>NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p>NID. GR.</p>	<p>NID. Ult. anno nidif. certa</p>
103	<p>Voltolino</p>	<p><i>Porzana porzana</i></p>	<p>M Bst</p>	<p>Poco freq.</p>	<p>- (Ornitho) quasi tutte le osservazioni sono relative al Lago Maggiore e Palude Brabbia. - (Regione Lombardia 2008) 2008, 2 indd. catturati nella stazione di inanellamento Palude Brabbia. - (Bianchi et al. 1973) definito comune di passo, estivo nidificante, forse invernale. •Note nidificazione: - (Bianchi et al. 1973) definito nidificante, "diverse coppie nidificano, lasciando però all'osservatore rarissime occasioni per poterne studiare le abitudini".</p>	<p>B</p>	<p>1973</p>
104	<p>Schiribilla</p>	<p><i>Porzana parva</i></p>	<p>M B? Bst</p>	<p>Poco freq.</p>	<p>- Di difficile osservazione, solitamente indd. isolati, principalmente primavera e autunno Lago Maggiore e Lago di Varese. - (Bianchi et al. 1973) definita comune nel passo primaverile, estiva nidificante e parzialmente invernale. •Note nidificazione: - (Saporetti F., 2001) solo dati di nidificazione probabile, osservazioni di individui e contatti al canto nel periodo riproduttivo, in Palude Brabbia e Lago di Varese. - (Bianchi et al. 1973) definita nidificante, "alcune coppie si stabiliscono nelle nostre paludi (Brabbia, Biandronno, Mergozzo, ecc.) per nidificarvi".</p>	<p>A</p>	<p>1973</p>
105	<p>Schiribilla grigiata</p>	<p><i>Porzana pusilla</i></p>	<p>Ast1</p>	<p>Stor.</p>	<p>- (Bianchi et al. 1973) definita discretamente presente nel passo primaverile, estiva, forse nidificante. Unica segnalazioni nota: 15/01/1966 1 ind. precedentemente osservato per più giorni tra i falaschi nelle vicinanze del golf di Luvinata e successivamente catturato abusivamente da un cacciatore locale.</p>		
106	<p>Re di quaglie</p>	<p><i>Crex crex</i></p>	<p>A3 (1)</p>	<p>Molto rara</p>	<p>- (Regione Lombardia 2009) 27/09/2009 1 ind. catturato alla Staz. Ornit. Dogana Vizzola Ticino (P. Bonazzi). - (Bianchi et al. 1973) definito raro, osservato di norma nel passo autunnale. Da testimonianze raccolte, la specie nei primi decenni del 1900 era invece abbastanza comune e oggetto di una caccia particolare. Due segnalazioni provinciali relative a individui catturati: settembre 1957 1 ind. Piana della Malpensa e ottobre 1950 1 ind. Monte Monarco Varese, più altri dati generici relativi alla prima metà del secolo scorso.</p>		
107	<p>Gallinella d'acqua</p>	<p><i>Gallinula chloropus</i></p>	<p>S B M W</p>	<p>Molto freq.</p>	<p>- (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, specie sicuramente sottostimata per la sua elusività, indd. censiti in crescita nell'ultimo decennio con una media di circa 284 indd./anno, max assoluto nel 2005 con 488 indd. di cui 313 sul Lago di Varese.</p>	<p>C</p>	<p>2017</p>
108	<p>Folaga</p>	<p><i>Fulica atra</i></p>	<p>M W S B</p>	<p>Molto freq.</p>	<p>- A livello provinciale numero massimo indd. censiti 3636 (IWC gennaio 2012). - (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, specie molto comune, progressivo incremento registrato con max 3625 indd. nel 2006, media decennio 2000-2010 di 2277 indd./anno.</p>	<p>C</p>	<p>2017</p>
GRUIFORMES		GRUIDAE					
109	<p>Gru</p>	<p><i>Grus grus</i></p>	<p>M W</p>	<p>Poco freq.</p>	<p>- Nei giorni e nelle notti del 28-29/11/2016, in seguito ad un fronte gelido da NE, è stato riscontrato un eccezionale fenomeno migratorio (mass migration) in particolare in alcune zone della provincia (Ternate, Cuveglio, Palude Brabbia, Gorla Minore, Varese), stimati qualche migliaio di indd. in migrazione. - (Bianchi et al. 1973) definita di passo periodico in primavera a piccoli gruppetti, segnalazioni relative al solo Lago di Varese negli anni: 1968, 1963, 1961, 1959, 1957, 1956, 1955.</p>		

LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017		Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.	Freq. oss.	NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE	NID. GR.	NID. Ult. anno nidif. certa
Nr	Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia					
<b>GRUIFORMES OTIDIDAE</b>						
110	Ubara asiatica <i>Chlamydotis macqueenii</i>	Ast1	Stor.	- (Moltoni E., 1952) 14/10/1951 1 ind. ucciso nella riserva di caccia della Maddalena Somma Lombardo e donato al museo di Milano.		
111	Otarda <i>Otis tarda</i>	Ast1	Stor.	- (Moltoni E., 1968) anno 1841 1 ind. Lago di Varese, nota ripresa da: Cattaneo 1844, Notizie Naturali e Civili su la Lombardia, pag.374. - (Bianchi et al. 1973) 1 ind. probabilmente catturato nei pressi della Bruschera di Angera il 18/01/1968, non considerato perché segnalato come probabile.		
<b>CHARADRIFORMES HAEMATOPODIDAE</b>						
112	Beccaccia di mare <i>Haematopus ostralegus</i>	M	Poco freq.	- (Ornitho) individui isolati periodo aprile/giugno e agosto/settembre, Lago Maggiore principalmente Germignaga Foce Tresa, Ispra e Monvalle. - (Tosi & Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000 : lug. 1999 4 indd. Lago di Varese, 4/09/1999 1 ind. Lago Maggiore. - (Bianchi et al. 1973) definita di comparsa rara nella tarda primavera e da fine agosto a metà settembre, segnalazioni anni: 1964 1963 1940 1936.		
<b>CHARADRIFORMES RECURVIROSTRIDAE</b>						
113	Cavaliere d'Italia <i>Himantopus himantopus</i>	M B	Poco freq.	- Specie osservata principalmente nei mesi primaverili e estivi nella zona umida delle Vasche Arnetta di Lonate Pozzolo. - (Tosi & Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000 : 26/04/1997 2 indd. Lago Maggiore, 29/03/2000 1 ind. Lago di Varese, 27/04/2000 14 indd. Palude Brabbia. - (Bianchi et al. 1973) definito molto raro, segnalazioni anni: 1964,1953. ●Note nidificazione: - Le nidificazioni accertate sono tutte avvenute in un' area confinante con la provincia di Milano (Vasche Arnetta Lonate Pozzolo).	F	2014
114	Avocetta <i>Recurvirostra avosetta</i>	A6 (2)	Molto rara	- (Ornitho) 11-12/05/2016 1 ind. Germignaga (M.Viganò, F.Saporetto et al.), 8/05/2011 2 indd. Sabbie D'Oro Ispra (E.Giussani). - (Bianchi et al. 1973) definita molto rara, segnalazioni anni: sett. 1969 1 ind. loc. Bruschera Angera, 15/01/1968 1 ind. catturato loc. Bruschera Angera, marzo 1962 1 ind. catturato Palude Brabbia Varese, 3/04/1958 1 ind. catturato Palude Brabbia Varese (collezione Bianchi E.).		
<b>CHARADRIFORMES BURHINIDAE</b>						
115	Occhione <i>Burhinus oedicnemus</i>	A8 (5)	Molto rara	- (Ornitho) 26/01/2016 1 ind. recuperato morto dal veterinario M.Marelli nei pressi di Gorla Maggiore (rif. E.Bassi), 16/04/2012 2 indd. Lonate Pozzolo (S.Daverio), 19/04/2010 1 ind. Lozza (M.Tomasi), 18/02/2009 1 ind. Brebbia (Anonimo tramite A.Boto). - (EBN/BL) 27/04/2008 1 ind. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (C.Dell'Acqua). - (Bianchi et al. 1973) "Non si hanno osservazioni recenti per questi territori " ... "Cacciatori locali assicurano che questo trampoliere non è raro durante le epoche di passo". Segnalazioni: 27/09/1953 2 indd. (m. e f.) Turbigaccio Lonate Pozzolo, 4/10/1951 1 ind. m. Turbigaccio Lonate Pozzolo, 6/11/1939 1 ind. Lisanza Sesto Calende.		
<b>CHARADRIFORMES GLAREOLIDAE</b>						
116	Corrione biondo <i>Cursorius cursor</i>	Ast1	Stor.	- (Bianchi et al. 1973) 9/11/1880 1 ind. catturato sul Lago di Varese (donato al Museo Civico di Varese), altre segnalazioni non documentate anno 1831.		

Nr	<p>LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p>Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>		<p>Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p>Freq. oss.</p>	<p>NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p>NID. GR.</p>	<p>NID. Ult. anno nidif. certa</p>
	<p>CHARADRIFORMES CHARADRIIDAE</p>						
117	Corriere piccolo	<i>Charadrius dubius</i>	M B	Freq.	- Osservazioni da fine marzo a settembre, con punte a aprile e maggio.	C	2016
118	Corriere grosso	<i>Charadrius hiaticula</i>	M	Poco freq.	<p>- La quasi totalità delle osservazioni è relativa ad alcune zone rivierasche del Lago Maggiore (Ispra, Monvalle, Besozzo, foce del Tresa a Germignaga).</p> <p>- (Tosi &amp; Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000 : 14/05/1997 3 indd. Lago Maggiore.</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) definito raro, esclusivamente di passo lungo il Ticino.</p>		
119	Fratino	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Ast2	Stor.	<p>- (Saporetti et al. 1977) 1/04/1974, 1 ind. foce fiume Tresa Luino (F.Saporetti).</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) definito raro, di passo lungo il Ticino. 13/04/1964 1 ind. Fiume Ticino.</p>		
120	Piviere tortolino	<i>Charadrius morinellus</i>	A7 (5)	Molto rara	<p>- (Ornitho) 12/09/2017 1 ind. in migrazione notturna Ternate (registraz. vocale - L.Giussani), 5/09/2017 1 ind. in migrazione notturna Ternate (registraz. vocale - L.Giussani), 28/08/2016 1 ind. Ferno (S.Daverio), 8/08/2013 1 ind. Lonate Pozzolo (S. Daverio).</p> <p>- (EBN/an2004) 15/09/2004 1 ind. juv Germignaga Lago Maggiore (M.Viganò).</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) definito raro, pochi individui vengono presi di tempo in tempo sia lungo i corsi dei fiumi come nelle brughiere, 29/09/1961 1 ind. m. juv. catturato nei pressi di Cairate (note personali prof. Moltoni) e sett. 1957 1 ind. piana della Malpensa.</p>		
121	Piviere dorato	<i>Pluvialis apricaria</i>	A6 (4)	Molto rara	<p>- (Ornitho) 24/09/2016 1 ind. Germignaga (oss. e foto A.Capoferri), 24/12/2012 3 indd. Ferno (S.Daverio), 26/11/2011 1 ind. Lonate Pozzolo (A.Vidolini), 4/12/2010 1 ind. Cuvio (M.Carabella, R.Pianezza).</p> <p>- (Tosi &amp; Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000 : 14/05/1997 1 ind. Lago Maggiore.</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) definito di passo, non comune. Occasionalmente qualche volo, anche di 50 individui, si fa sorprendere nelle rare insenature del Ticino e nelle campagne di Brebbia e di Monvalle. Una sola segnalazione documentata: 9/04/1933 1 ind. f. Lisanza Lago Maggiore.</p>		
122	Pivieressa	<i>Pluvialis squatarola</i>	A6 (5)	Molto rara	<p>- (Ornitho) 1/05/2017 4 indd. Foce Tresa Germignaga (F.Saporetti, L.D'Orazio, M.Bergomi), 24/05/2015 2 indd. foce Tresa Germignaga (F.Saporetti), dal 25/09/2013 al 6/10/2013 1-3 indd. Ispra / Besozzo (oss.vari), dal 4/09/2012 al 10/09/2012 1 ind. Monvalle / Besozzo (L.Giussani et al.).</p> <p>- (EBN/BL) 8-10/10/2005 1 ind. Germignaga (M.Viganò).</p> <p>- (Saporetti et al. 1977) 25/04/1976 2 indd. foce fiume Tresa Luino (F.Saporetti).</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) definita rarissima, non vengono indicate segnalazioni in prov. VA.</p>		
123	Pavoncella	<i>Vanellus vanellus</i>	M Wirr Bst	Poco freq.	<p>- Più frequentemente osservata nel periodo febbraio-marzo e luglio-novembre.</p> <p>- (Saporetti &amp; Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, unico dato anno 2002 1 ind. Lago Maggiore.</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>- (Guenzani &amp; Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987, anno 1984 Palude Brabbia - 2 coppie con nido.</p> <p>- (Realini 1977) apr./mag 1977 Palude Brabbia rinvenimento di un nido con 4 uova (R.Aletti), prima nidificazione accertata a livello provinciale. Nello stesso anno e nella stessa zona furono poi rinvenuti altri 2 nidi.</p>	B	1984

Nr	<p style="text-align: center;">LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p style="text-align: center;">Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>	<p style="text-align: center;">Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p style="text-align: center;">Freq. oss.</p>	<p style="text-align: center;">NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">NID. GR.</p>	<p style="text-align: center;">NID. Ult. anno nidif. certa</p>
	<i>CHARADRIFORMES</i> <i>SCOLOPACIDAE</i>					
124	Piovanello maggiore <i>Calidris canutus</i>	M	Rara	- Solitamente individui isolati o gruppetti di pochi individui, quasi esclusivamente Lago Maggiore mesi di agosto e settembre. - (Ornitho) osservazioni: ago set 2016, ago 2015, ago 2012, set 2008, ago 2005, ago 2004, max 4 indd. (oss.vari). - (Bianchi et al. 1973) definito rarissimo. 4/12/1969 1 ind. catturato a Lisanza Lago Maggiore (Coll. Martire).		
125	Piovanello tridattilo <i>Calidris alba</i>	M	Poco freq.	- Isolato o anche in gruppi di alcuni individui, mesi di aprile maggio agosto e settembre esclusivamente in alcune zone rivierasche del Lago Maggiore.		
126	Gambecchio comune <i>Calidris minuta</i>	M Wirr	Poco freq.	- Le osservazioni sono in gran parte riferite ad alcune località del Lago Maggiore (Ispra, Monvalle, Angera, foce del Tresa a Germignaga). - (Bianchi et al. 1973) definita specie di doppio passo e invernale, decisamente scarsa, segnalazioni anni: 1963.		
127	Gambecchio nano <i>Calidris temminckii</i>	M	Rara	- Le osservazioni sono in gran parte riferite ad alcune località del Lago Maggiore (Ispra, Monvalle, Angera, foce del Tresa a Germignaga) e Vasche Arnetta Lonate Pozzolo. - (Bianchi et al. 1973) definita specie rara di passo, segnalazioni documentate: 9/5/1968 Biandronno alcuni individui di cui 1 catturato e conservato, mag. 1963 1 ind. Fiume Ticino.		
128	Piovanello comune <i>Calidris ferruginea</i>	M	Poco freq.	- Scarsamente osservato, solitamente in numero limitato di individui e quasi esclusivamente nei mesi di fine estate, in particolare con condizioni di basso livello idrico del Lago Maggiore (Besozzo, Ispra, Germignaga, Angera). Discreta presenza agosto e settembre 2016 in alcune zone rivierasche del Lago Maggiore. - (Bianchi 1973 et al.) Un solo dato ma Piana di Magadino Svizzera, nessuna segnalazione per la provincia.		
129	Piovanello pancianera <i>Calidris alpina</i>	M Wirr	Poco freq.	- Solitamente mesi primaverili e in particolare agosto e settembre con condizioni di basso livello idrico del Lago Maggiore.		
130	Combattente <i>Philomachus pugnax</i>	M	Poco freq.	- La maggior parte delle osservazioni sono relative a zone rivierasche del Lago Maggiore (Ispra, Monvalle, foce del Tresa a Germignaga) e alle Vasche dell' Arnetta a Lonate Pozzolo. - (Bianchi et al. 1973) definito di doppio passo regolare.		
131	Frullino <i>Lymnocyptes minimus</i>	M Wirr	Rara	- (Ornitho) 2/12/2015 1 ind. Golasecca (F.Casale), 23/04/2014 1 ind. Ternate (L.Laddaga), 4/04/2014 2 indd. Ternate (L.Laddaga), 24/10/2013 1 ind. Ternate (L.Laddaga), 27/09/2013 1 ind. Sabbie d'Oro Ispra (L.Giussani), 9/04/1983 >3 indd. Palude Brabbia (F.Ornaghi). - (Tosi & Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000 : 26/04/1997 1 ind. Sabbie d' oro Brebbia. - (Bianchi et al. 1973) definito di passo in marzo - aprile, mai abbondante. Scarso e irrilevante nel passo autunnale.		
132	Beccaccino <i>Gallinago gallinago</i>	M Wirr Bst	Poco freq.	- Mesi di maggior presenza: agosto e settembre. - (Saporetti & Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, scarsi i dati come svernante, 2010 1 ind. Palude Brabbia, 2002 1 ind. Lago Maggiore, 2001 1 ind. Palude Brabbia, 1998 1 ind. Lago di Varese. ●Note nidificazione: - (Realini 1977) Maggio 1977: Palude Brabbia nido con 4 uova. Prima nidificazione documentata a livello nazionale.	B	1977

Nr	LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017  Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia	Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.	Freq. oss.	NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE	NID. GR.	NID. Ult. anno nidif. certa
133	Croccolone <i>Gallinago media</i>	M Bst	Rara	<p>- (EBN/BL) 30/04/2011 1 ind. Palude Brabbia (P.e L.Casali), 24/04/2008 1 ind. Palude Brabbia (P.Casali).  - (Luoni F., Scandolara C., 2008) apr. 2008 1 ind. Palude Brabbia.  - (EBN/an2007) 28/04/2007 2 indd. Palude Brabbia (L.Marocchi, P.Casali).  - (Tosi &amp; Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000 : 24/02/1997 2 indd. Palude Brabbia, 12/03/2000 1 ind. Palude Brabbia.  - (Bianchi et al. 1973) definita specie poco osservata, il ripasso primaverile avviene in aprile e nella prima quindicina di maggio. Settembre 1967 1 ind. Case Nuove Malpensa.  - (Monti 1845) Tra i siti dove il croccolone abbonda viene citata la Palude Brabbia.</p> <p>●Note nidificazione:  '- (Bianchi et al. 1973) riporta la segnalazione di due casi di nidificazione sulle sponde del Lago di Varese, sottobosco ontani zona del Pan (N.d.R. attuale zona fronte Lago Volo a Vela Calcinata del Pesce): 1936 - 1937 nido con tre uova e giugno 1943 nido con 4 uova con nascita piccoli prima decade di luglio.</p>	B	1943
134	Beccaccia <i>Scolopax rusticola</i>	M W B	Poco freq.	<p>- Osservazioni nei mesi autunnali / invernali di individui in migrazione e sosta e a inizio primavera durante la migrazione prenuziale.</p> <p>●Note nidificazione:  '- (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 non è stato possibile accertare la nidificazione certa della specie, solo segnalazioni di nidificazioni probabili in diverse aree del territorio provinciale.  Al di fuori della ricerca l' unico dato di nidificazione certa relativo a questo secolo è il rinvenimento di un nido con uova nella prima decade di aprile del 2006 individuato attraverso una ricerca mirata con l' ausilio di cani da ferma addestrati.  - (Soave &amp; Rizzi 1997) segnalati 2 indd. in periodo riproduttivo 1992-1995 nel Parco dell'Alto Milanese comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano).  - (Realini 1982) nel tratto del Ticino in provincia di Varese, nei confini della Riserva di caccia "La Maddalena", nel 1970 "sarebbero venuti alla luce 3 piccoli".</p>	F	2006
135	Pittima reale <i>Limosa limosa</i>	A6 (2)	Molto rara	<p>- (Ornitho) 19/02/2012 1 ind. Schiranna/Cazzago (M.Tomasi et al.), 13/10/2010 1 ind. foce fiume Tresa Germignaga (C.Scandolara).  - (A.Viganò rif.) 5/10/1997 4 indd. Bruschera Lago Maggiore (P.Zanetti).  - (Tosi &amp; Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000 : 20/03/1997 1 ind. Palude Brabbia, 28/03/1998 1 ind. Lago Maggiore, 14/03/1999 3 indd. Lago di Varese.  - (Bianchi et al. 1973) definita rara, segnalazioni non documentate decennio 1930/1940 Lago Maggiore e alcune altre in località confinanti con la provincia.</p>		
136	Pittima minore <i>Limosa lapponica</i>	M	Rara	<p>- (Ornitho) set 2016, set ott 2013, sett 2010, max 2 indd. (oss.vari).  - (A.Viganò rif.) 28/03/1998 1 ind. lido del Laurass Ispra.  - (Tosi &amp; Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997 /2000 : 24/04/1997 1 ind. lido del Laurass Ispra.</p>		
137	Chiarlo piccolo <i>Numenius phaeopus</i>	M	Rara	<p>- (Ornitho) presenti alcune segnalazioni post 2009 in particolare Lago Maggiore mesi primaverili.  - (M.Viganò rif.) 9/04/2005 5 indd. Germignaga.  - (Tosi &amp; Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000 : 18/04/1998 1 ind. foce fiume Tresa Germignaga.  - (Bianchi et al. 1973) definito scarso, sconosciuto ai cacciatori o confuso con il chiarlo maggiore, segnalazioni anni 1968,1965,1943 e catture non documentate a Lisanza.</p>		

Nr	LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017  Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia	Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.	Freq. oss.	NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE	NID. GR.	NID. Ult. anno nidif. certa
138	Chiurlottello <i>Numenius tenuirostris</i>	Ast1	Stor.	- (Bianchi et al. 1973) definita specie rarissima. 3/11/1917 1 ind. ucciso in località Sabbie sul Ticino. - (SBCWG - Gruppo di lavoro sul chiurlottello www.slenderbilledcurlew.net) viene ormai indicato come l'uccello più raro del Palearctico occidentale, in pericolo di estinzione e senza avvistamenti confermati dal 1998.		
139	Chiurlo maggiore <i>Numenius arquata</i>	M Wirr	Rara	- (Ornitho) presenti alcune segnalazioni post 2012 in particolare Lago Maggiore, Ferno zona Malpensa e Lonate Pozzolo. - (Laddaga L., Casale F., 2014) 13/11/2013 2 indd. Palude Brabbia (G.Zanetti), 23/04/1998 1 ind. Palude Brabbia (A.Viganò dati ined.). - (EBN/BL) 3/04/2008 1 ind. Ispra/Brebbia Lago Maggiore (P.e L.Casali), 01/01/2009 1 ind. Varese (A.Giusto). - (Tosi & Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000 : 19/04/1998 1 ind. Lago Maggiore, 23/04/1998 1 ind. Palude Brabbia. - (Laddaga L., Casale F., 2014) negli anni 80' qualche indd. frequentava i prati umidi nei pressi della località Gaggio Palude Brabbia (G.Pinoli). - (Bianchi et al. 1973) definita specie di doppio passo, regolare tutti gli anni sempre però in scarso numero.		
140	Piro-piro codalunga <i>Bartramia longicauda</i>	A1 (1)	Molto rara	- (Ornitho) 28/10/2011 1 ind. area Malpensa Lonate Pozzolo (A.Vidolini).		
141	Piro-piro piccolo <i>Actitis hypoleucos</i>	M W B? Bst	Freq.	- Osservazioni durante tutto il periodo dell'anno, più frequentemente aprile maggio agosto e settembre. •Note nidificazione: - (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 solo segnalazioni di nidificazione probabile localizzate: loc. Monvallina Lago Maggiore e alcuni tratti del fiume Ticino loc. Maddalena,Vizzola Ticino, Tornavento e Turbigaccio (Lonate Pozzolo). - (Bianchi et al. 1973) "Nidificante lungo le sponde del Ticino ed anche dei suoi piccoli affluenti, il 15/06/1967 incontrammo al Ponte di Oleggio Ticino una coppia che con strida cercava di allontanarci dal tratto di riva boscosa dove certamente aveva i piccoli nascosti fra i sassi e le erbe".	A	1967?
142	Piro-piro culbianco <i>Tringa ochropus</i>	M Wirr	Poco freq.	- La maggior parte delle osservazioni si riferiscono alle zone umide del Lago Maggiore (Bruscherà, Sabbie d'Oro, foce del Tresa a Germignaga), Palude Brabbia e Vasche dell'Arnetta a Lonate Pozzolo.		
143	Totano moro <i>Tringa erythropus</i>	M	Rara	- (Ornitho) Le poche osservazioni sono quasi tutte relative al Lago Maggiore e alle Vasche Arnetta di Lonate Pozzolo, numero massimo delle osservazioni nei mesi di aprile e settembre. - (Tosi & Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000 : 16/04/1997 3 indd. Lago Maggiore, 01/09/1998 1 ind. Lago Maggiore. - (Bianchi et al. 1973) 5/05/68 diversi indd. osservati al laghetto di Biandronno.		
144	Pantana <i>Tringa nebularia</i>	M Wirr	Poco freq.	- La maggior parte delle osservazioni si riferiscono alle zone umide del Lago Maggiore (Sabbie d' Oro, foce del Tresa a Germignaga) e alle Vasche dell' Arnetta a Lonate Pozzolo.		
145	Albastrello <i>Tringa stagnatilis</i>	A1 (1)	Molto rara	- (Ornitho) 12/04/2013 1 ind. Germignaga (M.Carabella).		
146	Piro-piro boschereccio <i>Tringa glareola</i>	M	Poco freq.	- La maggior parte delle osservazioni è relativa alle Vasche dell' Arnetta a Lonate Pozzolo, al Lago di Varese e alla foce del Tresa a Germignaga.		

Nr	<p>LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p>Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>	<p>Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p>Freq. oss.</p>	<p>NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p>NID. GR.</p>	<p>NID. Ult. anno nidif. certa</p>
147	<p>Pettegola <i>Tringa totanus</i></p>	M	Poco freq.	<p>- Principali osservazioni nei mesi di aprile, maggio, agosto e settembre in alcune zone rivierasche del Lago Maggiore (Ispra, Besozzo, Germignaga) e alle Vasche dell'Arnetta di Lonate Pozzolo. - (Bianchi et al. 1973) definita di doppio passo, più abbondante in quello primaverile.</p>		
148	<p>Voltapietre <i>Arenaria interpres</i></p>	M	Poco freq.	<p>- (Ornitho) tutte le osservazioni sono relative al Lago Maggiore, in particolare mesi di agosto settembre e ottobre, poche nel periodo primaverile. - (M. Viganò rif.) Apr. 2004 1 ind. Germignaga. - (Bianchi et al. 1973) 20/09/1966 1 ind. in abito autunnale osservato sul Lago Maggiore (F.Realini rif.).</p>		
149	<p>Falaropo beccosottile <i>Phalaropus lobatus</i></p>	A2 (1)	Molto rara	<p>- (EBN/an2004) dal 17/10/2004 al 24/10/2004 1 ind. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (A.Turri, A.Giusti, C.Dell'Acqua et al.). - (Bianchi et al. 1973) definito accidentale, 4/09/1887 1 ind. catturato sul Lago di Varese (donato al Museo di Storia Naturale di Milano).</p>		
150	<p>Falaropo beccolargo <i>Phalaropus fulicarius</i></p>	Ast1	Stor.	<p>- (Bianchi et al. 1973) definito accidentale. Prima quindicina di nov. 1949, 1 ind. catturato a Sesto Calende (donato al Museo di Milano).</p>		
	<p><b>CHARADRIFORMES</b> <b>STERCORARIIDAE</b></p>					
151	<p>Labbo <i>Stercorarius parasiticus</i></p>	A4 (1)	Molto rara	<p>- (Ornitho) dal 23/05 al 9/06/2015 1 ind. 3cy Besozzo-Brescia (R.Aletti, W.Guenzani et al.). Il soggetto osservato in zona per 18 giorni è stato rinvenuto agonizzante da F.Aresi socio GIO il giorno 9/06/2015 ed è morto poco dopo. L'esame autoptico, condotto dal Dott. Vet. Luca Visconti, ha accertato che l'animale è morto di cause naturali e che la causa del decesso è attribuibile a un'infezione da funghi (che causa granulomi concentrici sugli organi interni). L'esemplare è stato tassidermizzato e donato dal GIO al Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio e Induno Olona. - (Bianchi et al. 1973) nov. 1965 1 ind. catturato sul Lago Maggiore e conservato (L.Berrini), anno 1965 1 ind. trovato morente e conservato nella raccolta del seminario di Venegono, 4/11/1963 1 ind. juv. m. catturato Lago di Varese (coll. E.Bianchi). Inoltre segnalazione non meglio documentata relativa al decennio 1955-1965 di 4 indd. uccisi sul Lago di Varese (N.d.R. non considerata).</p>		
152	<p>Labbo codalunga <i>Stercorarius longicaudus</i></p>	A8 (1)	Molto rara	<p>- (EBN/an2004) 1/09/2004 1 ind. juv rinvenuto stremato a Gallarate. - (Bianchi et al. 1973) definito raro, set. 1954 1 ind. Lago Maggiore (Martorelli, pag.112), 14/11/1949 1 ind. catturato a Lisanza sul Lago Maggiore e donato (collezione L.Favero). Altre segnalazioni tutte relative al Lago Maggiore: ott. 1949 1 ind., set. 1949 1 ind. (Martorelli, pag 112), 7/09/1935 1 ind. (Moltoni), 31/08/1930 1 ind. juv., 31/08/1925 1 ind. juv. (Moltoni).</p>		
153	<p>Stercorario maggiore <i>Stercorarius skua</i></p>	Ast1	Stor.	<p>- (Zanetti P. 1978) 25/09/1976, 1 ind. (f. di 14 mesi con anello Museum London HW 52.707 inanellata da pullus il 15 lug. 1975 a Foula, Shetland, Scozia) catturato sul Lago di Varese e conservato (collez. P. Zanetti). - (Bianchi et al. 1973) anno 1963 una cattura definita probabile e senza località indicata (N.d.R. non considerata).</p>		
154	<p>Stercorario mezzano <i>Stercorarius pomarinus</i></p>	A1 (1)	Molto rara	<p>- (Ornitho) 8 e 12/12/2017 1 ind. (lo stesso nelle due date) 1cy morfismo scuro Lago Maggiore Ranco-Ispra (L.Giussani et al.). - (Bianchi et al. 1973) una unica cattura Lago Maggiore ma Belgirate (N.d.R. oss. sponda piemontese non considerata). - (Monti 1845) una osservazione generica presso Angera (N.d.R. oss. generica non considerata).</p>		

Nr	<p style="text-align: center;">LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p style="text-align: center;">Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>		<p style="text-align: center;">Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p style="text-align: center;">Freq. oss.</p>	<p style="text-align: center;">NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">NID. GR.</p>	<p style="text-align: center;">NID. Ult. anno nidif. certa</p>
	<b>CHARADRIFORMES LARIDAE</b>						
155	Gabbiano tridattilo	<i>Rissa tridactyla</i>	A7 (2)	Molto rara	- (Ornitho) 8 e 9/12/2017 1 ind. 1cy Porto Ceresio (D.Ronconi et al.), 4/09/2012 1 ind. 1cy Luino (M.Viganò). - (Guenzani & Zarbo, 2006) Lago Maggiore censimento invernale 1998, 2 indd. osservati. - (Bianchi et al. 1973) segnalazioni documentate: 2/05/1965 8 indd. loc. Sabbie d' Oro Lago Maggiore, 25/05/1937 1 ind. Lisanza, 15/11/1926 1 ind. Luino. Feb. 1947 1 ind. Lisanza, 13/12/1941 Lago Ceresio ? (N.d.R. non considerata forse Svizzera).		
156	Gabbiano comune	<i>Larus ridibundus</i>	M W	Molto freq.	- (Saporetti & Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, diffuso come svernate con un valore medio indd. censiti di oltre 2000 indd./anno e un max di 4247 indd. nel 2001.		
157	Gabbianello	<i>Larus minutus</i>	M Wirr	Poco freq.	- La quasi totalità delle osservazioni è relativa al Lago Maggiore e Lago di Varese. - (Saporetti & Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, 2 soli indd. censiti sul fiume Ticino nel 2010. - (Bianchi et al. 1973) definito raro in autunno, più frequente in primavera.		
158	Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>	M Wirr	Poco freq.	- La quasi totalità delle osservazioni si riferisce a Lago Maggiore, in particolare alla foce del Tresa, qualche osservazione alle vasche dell' Arnetta a Lonate Pozzolo e Lago di Varese.		
159	Gavina	<i>Larus canus</i>	M W	Freq.	- La quasi totalità delle osservazioni è relativa al periodo invernale, Lago Maggiore e Lago di Varese. - A livello provinciale numero massimo indd. censiti 118 (IWC gennaio 2013). - (Saporetti & Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, terzo laride svernante più diffuso dopo il gabbiano comune e reale. Nel 1997 censiti indd. 109 (di cui circa l' 80% sul Lago Maggiore); nel decennio 2001-2010 sul Lago Maggiore registrati in media 41 indd./anno; per Lago di Monate, di Varese e di Lugano dati sempre inferiori ai 20 indd./anno.		
160	Zafferano	<i>Larus graellsii</i>	M W	Poco freq.	- Quasi tutte le osservazioni sono relative al periodo invernale-primaverile. - (Saporetti & Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, dati scarsi come svernante, 2006 2 indd. Lago Maggiore, 2010 1 ind. Lago di Lugano.		
161	Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus</i>	M W	Poco freq.	- La gran parte delle osservazioni sono relative al periodo invernale Lago di Varese e Lago Maggiore. - (Saporetti & Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, prima segnalazione nel 2006 con 2 indd. Lago Maggiore, 2010 2 indd. Lago Maggiore e 3 indd. Lago di Comabbio.		
162	Gabbiano reale	<i>Larus michahellis</i>	S B M W	Molto freq.	- (Saporetti & Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, nel decennio 2001-2010 si registra una progressione costante degli indd. arrivando a un massimo di 327 indd. censiti nel 2008, poi calo del 50% nel 2009 e aumento nel 2010 ai massimi del decennio. ●Note nidificazione: - (Ornitho) Ultima nidificazione nota maggio 2013, 2 ad. e 1 pullo, su un pontile a Lisanza (F.Saporetti, W.Guenzani et al.).	C	2013
163	Gabbiano reale pontico	<i>Larus cachinnans</i>	M W	Poco freq.	- La gran parte delle osservazioni sono relative al periodo invernale Lago di Varese e Lago Maggiore. - (Saporetti & Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, prima e unica segnalazione durante i censimenti IWC nel 2006 1 ind. Lago Maggiore.		
164	Mugnaiaccio	<i>Larus marinus</i>	A2 (2)	Molto rara	- (EBN/an2006) 2/03/2006 1 ind. ad. Gorla Maggiore (A.Nicoli). - (EBN/an2005) 8/12/2005 1 ind. imm. Ispra Lago Maggiore (O.Janni, A. Nicoli, R.Garavaglia).		



Nr	<p style="text-align: center;">LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p style="text-align: center;">Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>		<p style="text-align: center;">Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p style="text-align: center;">Freq. oss.</p>	<p style="text-align: center;">NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">NID. GR.</p>	<p style="text-align: center;">NID. Ult. anno nidif. certa</p>
	<p>CHARADRIFORMES      STERNIDAE</p>						
165	Fratricello	<i>Sterna albifrons</i>	Ast1	Stor.	- (Bianchi et al. 1973) definita specie molto rara. 13/10/1944 1 ind. m. catturato sul Lago Maggiore (donato Museo di Basilea).		
166	Sterna zampenere	<i>Sterna nilotica</i>	A2 (2)	Molto rara	- (C.Dell'Acqua e F.Pianezza rif.) 18/07/2010 2 indd. loc. Arnetta in volo direz. Varese (C.Dell'Acqua, P.Alberti). - (M.Carabella e F.Pianezza rif.) 3/05/2005 1 ind. in volo Palude Brabbia (zona Agricola Paludi).		
167	Sterna maggiore	<i>Hydroprogne caspia</i>	A3 (3)	Molto rara	- (Ornitho) dal 7/09/2013 al 12/09/2013 1 ind. juv loc. Bruschera Angera (R.Aletti, W.Guenzani, A.Vidolini et al.), anello giallo zampa dx C99Y inanellato da pullus a Maksamaa (Vaasa) Finlandia l' 11/07/2013 da Stefan Sjöhlom, 27/07/2002 1 ind. Lago di Comabbio (A.Viganò). - (M.Viganò rif.) set. 2003 2 indd. Germignaga.		
168	Mignattino piombato	<i>Chlidonias hybridus</i>	M	Rara	- Le poche osservazioni si riferiscono quasi esclusivamente al Lago Maggiore e al Lago di Varese. Numero max indd. oss. 11/05/2014 12 indd. Lago Varese (R.Aletti, L.Laddaga/Ornitho).		
169	Mignattino comune	<i>Chlidonias niger</i>	M Bst?	Poco freq.	- La quasi totalità delle osservazioni sono relative al Lago Maggiore e al Lago di Varese, qualcuna alle Vasche dell'Arnetta a Lonate Pozzolo. ●Note nidificazione: - (Casale et al, 2011) segnalato come nidificante storico in alcune province Lombarde tra cui quella di Varese. - (Bianchi et al. 1973) negli anni 60' nei mesi di giugno e luglio vengono spesso osservati sul Lago Maggiore da Angera a Lisanza dei giovani imbeccati al volo dai genitori con dei pescolini. Ultima segnalazione documentata anno 1969. - La specie in questa Lista in relazione ai dati riportati viene definita nidificante storica con qualche dubbio poichè, per quanto riguarda gli sternidi, le segnalazioni di indd. giovani imbeccati dagli adulti non possono essere considerate prove di nidificazione certa in riferimento alla zona di osservazione.	B	1969?
170	Mignattino alibianche	<i>Chlidonias leucopterus</i>	M	Rara	- Le osservazioni si riferiscono quasi esclusivamente al Lago Maggiore e al Lago di Varese. - (Bianchi et al. 1973) definita specie molto rara.		
171	Beccapesci	<i>Sterna sandvicensis</i>	A6 (6)	Molto rara	- (Ornitho) 23/08/2017 1 ind. ad.ab.inv. Brebbia (L.Prada et al.), 11/07/2017 1 ind. Foce Tresa Germignaga (M.Bergomi, A.Pentassuglia et al.), 2/06/2015 1 ind. Besozzo (D.Bernasconi), 30/07/2011 3 indd. (2 ad. e 1 juv.) Germignaga (A.Martinoli). - (M.Viganò rif.) Maggio 2005 1 ind. Germignaga, 28/06/2004 1 ind. Germignaga.		
172	Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>	M Bst	Poco freq.	- Qualche osservazioni durante la migrazione primaverile e autunnale, in particolare Lago Maggiore, Lago di Varese e Vasche Arnetta Lonate Pozzolo. Discreta presenza mesi luglio e agosto 2017 Lago Maggiore Ispra/Monvalle, oltre 14 indd. osservati insieme. ●Note nidificazione: - (Bianchi et al. 1973) numerose testimonianze di abituale nidificazione lungo il fiume Ticino fino al 1960, successivamente segnalato qualche caso di nidificazione nelle paludi di Angera Lago Maggiore.	B	1969
173	Sterna codalunga	<i>Sterna paradisaea</i>	A1 (1)	Molto rara	- (Ornitho) 23/09/2016 1 ind. Ispra (L.Bergamaschi, L.Bonomelli et al.).		

Nr	LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017  Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia		Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.	Freq. oss.	NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE	NID. GR.	NID. Ult. anno nidif. certa
<b>COLUMBIFORMES</b> <b>COLUMBIDAE</b>							
174	Piccione selvatico	<i>Columba livia</i>	Sst Bst	Stor.	<p>- Specie sedentaria nidificante storica non più contattata dopo il 1968.</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) "Dal 1962 al 1968 abbiamo constatato la presenza in maggio e giugno di alcuni soggetti nel "Vallone del Ceppone" sul monte Campo dei Fiori sopra Luvinata".</p> <p>- Le informazioni sopra indicate si riferiscono alla specie nominale selvatica, tuttavia "le popolazioni Italiane vivono in gran parte allo stato domestico (<i>Columba livia</i> var. domestica, piccione di città), soprattutto nelle regioni centro-settentrionali ..." (Brichetti e Fracasso 2006).</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>- (Arrigoni degli Oddi 1929) segnala la presenza di una colonia nidificante sulle sponde del Lago Maggiore.</p>	B	1929
175	Colombella	<i>Columba oenas</i>	M Wrr B?	Rara	<p>- (Ornitho) maggio giugno 2017 max 6 indd. Lonate Pozzolo (oss.vari), 1/05/2016 1 ind. Germignaga (M.Viganò), 31/05/2014 1 ind. Lonate Pozzolo (F.Casale), 18/10/2013 1 ind. Casale Litta (L. Laddaga), 29/12/2012 2 indd. Tradate (L. Laddaga).</p> <p>- (Laddaga L., Casale F., 2014) 30/09/2013 1 ind. Palude Brabbia (Luoni F.).</p> <p>- (EBN/BL) 17/10/2010 4 indd. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (A.Nicoli), 5/03/2007 6 indd. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (C.Misin, A.Giusto), 21/03/2006 1 ind. Palude Brabbia (L.Marocchi).</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) definita non abbondante, di passo e invernale. Il 26/12/1971 numerosi indd. zona Malpensa, 7/2/1967 50 indd. zona Malpensa, altre segnalazioni anni: 1966,1964,1946.</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>'- (Ornitho) 1/06/2017 2 indd. Lonate Pozzolo, riscontro nidif. probabile con comportamento nuziale, canto, display aereo (segnalazione M.Galuppi - R.Aletti, L.Giussani, W.Guenzani).</p> <p>- (Casale 2015) 2010-2014 segnalato qualche dato di "nidificazione probabile" in riferimento alla presenza di qualche coppia anche in un tratto del Fiume Ticino in provincia di Varese.</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) agosto 1966 solo un dato di possibile nidificazione in riferimento all'osservazione di alcune colombe di colorito chiaro in pastura nei pressi della Malpensa.</p>	X	
176	Colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	M W S B	Molto freq.	- Specie essenzialmente migratrice e sedentaria solo parzialmente, in aumento come nidificante.	C	2017
177	Tortora dal collare	<i>Streptopelia decaocto</i>	S B	Molto freq.	- Specie quasi esclusivamente legata alle zone urbanizzate ed in espansione negli ultimi decenni; presente in provincia dal 1945 (Bianchi et al. 1973).	C	2017
178	Tortora selvatica	<i>Streptopelia turtur</i>	M B	Poco freq.	<p>- Le osservazioni sono tutte relative al periodo primaverile-estivo, in particolare maggio e giugno.</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>- (Gagliardi et al. 2007) ricerca 2003/2005, anche se la specie viene censita con classe di abbondanza comune, risulta nidificare con coppie sparse in prevalenza nel settore centro-meridionale e nel fondovalle della parte montuosa della provincia.</p>	D	2005
<b>PSITTACIFORMES</b> <b>PSITTACIDAE</b>							
179	Parrocchetto dal collare	<i>Psittacula krameri</i>	S? M? Int	Rara	- Specie introdotta o sfuggita alla cattività. Alcuni individui si sono naturalizzati e nidificano in alcune province vicine (MB MI PV). Non risulta aver mai nidificato nel territorio provinciale.		
<b>CUCULIFORMES</b> <b>CUCULIDAE</b>							
180	Cuculo dal ciuffo	<i>Clamator glandarius</i>	A2 (1)	Molto rara	<p>- (EBN/an2007) 19/04/2007 1 ind. Luino (M.Viganò).</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) 1/10/1968 1 ind. juv ucciso sembra nei pressi di Castellanza e osservato presso un tassidermista di Gallarate (D.Fabris).</p>		

Nr	<p>LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p>Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>	<p>Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p>Freq. oss.</p>	<p>NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p>NID. GR.</p>	<p>NID. Ult. anno nidif. certa</p>
181	<p>Cuculo <i>Cuculus canorus</i></p>	M B	Freq.	- Il massimo delle osservazioni durante la migrazione primaverile in particolare mesi di aprile e maggio.	C	2016
<p>STRIGIFORMES TYTONIDAE</p>						
182	<p>Barbagianni <i>Tyto alba</i></p>	S B? M Bst	Rara	<p>- Oltre all' esigua popolazione locale, possibili erratismi anche a medio raggio di individui giovani durante il periodo autunnale.</p> <p>- (Ornitho) giu set 2017, apr mag 2016, set ott 2015, ott nov 2011 max 1 ind. (oss.vari).</p> <p>- (EBN/BL) lug 2008 1 ind. Gorla Maggiore (A.Giusto).</p> <p>- (Viganoni R. rif.) 3/06/2005 2 indd. posati su una strada presso Colmegna.</p> <p>- (Laddaga L., Casale F., 2014) seconda decade marzo 1995 1 ind. Palude Brabbia (A.Viganò dati ined.).</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) "sino a dieci anni fa era molto comune nei paesini rurali della provincia, ora in alcune zone è addirittura rarissimo. Resta comunque un uccello comune se si osserva con quale frequenza sconcertante vengono affidati esemplari agli imbalsamatori locali".</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>- (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 limitato il numero di individui osservati nel periodo di nidificazione, mai riscontrate prove di nidificazione certa. Al di fuori del periodo della ricerca l' unica nidificazione accertata e verificata da uno degli autori (W.Guenzani) risale al 1982 e si riferisce ad un nido con piccoli nel centro storico di Gerenzano.</p>	A	1982
<p>STRIGIFORMES STRIGIDAE</p>						
183	<p>Assiolo <i>Otus scops</i></p>	M B	Poco freq.	<p>- (Ornitho) osservazioni post 2009 relative al periodo primaverile / estivo.</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) "La sua presenza passa quasi inosservata ... presente comunque con regolarità ogni anno, uniformemente distribuito sul territorio provinciale.</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>- Nidificazioni di una coppia nei pressi di Angera anni : 2016 2015 2013 2010 (rif. A.Ravasi e confermate dal G.I.O.).</p> <p>- (Ravasi A., Guenzani W., 2014) 28/04/2010 Angera (prima nidificaz. accertata in provincia), almeno 1 ind. juv. nel nido in cavità di un tronco morto di salice . La nidificazione si e' ripetuta anche nel 2011 nella stessa località.</p>	F	2016

Nr	LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017  Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia	Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.	Freq. oss.	NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE	NID. GR.	NID. Ult. anno nidif. certa
184	Gufo reale <i>Bubo bubo</i>	S B	Rara	<p>- (G.I.O.) Ricerca specie rupicole Gruppo Insubrico di Ornitologia anni 2016-2017: dal 17/06/2016 (data prima osservazione) al 31/12/2017 osservati alcuni indd. (m. ad, f. ad., juv. dell'anno) in tre località situate nella parte centro-settentrionale della provincia.</p> <p>- (Aletti R., Carabella M., 2015) Varese: 21/01/2014 1 ind. conferito al CRAS di Vanzago (MI) con ala e zampa amputata; somministrata eutanasia.</p> <p>- (G.Danini rif.) 30/10/2011 1 ind. in canto Monte Useria Arcisate.</p> <p>- (Provincia di Varese, 2012) maggio 2009 1 ind. ritrovato debilitato in Valle Olona (Induno Olona), rilasciato in luglio nella medesima località.</p> <p>- (W.Guenzani rif.) 5/04/2007 1 ind. m. di 2 anni rinvenuto morto a Viggiù, 1996 1 ind. rinvenuto debilitato a Lozza e poi liberato nel 1997 dal WWF di Vanzago.</p> <p>- (Aebischer, 2008): nel 2006 nei pressi di Laveno 1 ind. juv. marcato con radio satellitare in Canton Ticino nel 2005.</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) definita specie rara e di difficile osservazione. Segnalazioni anni: 1956.</p> <p>- (Moltoni E. 1948) 23/01/1943 1 ind. m. rinvenuto nei dintorni di Cantello.</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>- (G.I.O.) Ricerca specie rupicole Gruppo Insubrico di Ornitologia: Anno 2017 mese di maggio confermata nidificazione in una diversa località rispetto al 2016 sempre situata nella parte centro-settentrionale della provincia (1 coppia e almeno 2 giovani).</p> <p>Anno 2016, mese di giugno confermata nidificazione in una località situata nella parte centro-settentrionale della provincia (1 coppia e 3 giovani / prima nidificazione accertata in provincia).</p>	F	2017
185	Civetta nana <i>Glaucidium passerinum</i>	Ast	Stor.	- (Bianchi et al. 1973) "osservati presso un imbalsamatore di Gallarate uno o due esemplari di questa specie provenienti nominalmente dalle nostre prealpi".		
186	Civetta <i>Athene noctua</i>	S B	Freq.	- Possibili erratismi a corto raggio di soggetti giovani dell'anno.	C	2017
187	Allocco <i>Strix aluco</i>	S B M?	Freq.	- La specie puo' effettuare spostamenti a corto raggio	C	2017
188	Gufo comune <i>Asio otus</i>	S B M W	Poco freq.	- Specie migratrice e sedentaria solo parzialmente in particolare nelle zone di pianura e collina della provincia.	C	2016
189	Gufo di palude <i>Asio flammeus</i>	A5 (4)	Molto rara	<p>- (Ornitho) 13/04/2012 1 ind. Lonate Pozzolo (rif A.Vidolini), 19/03/2012 1 ind. Casorate Sempione (S.Daverio).</p> <p>- (C.Dell'Acqua rif.) 14/03/2009 1 ind. osservato da birder belgi nella brughiera di Lonate Pozzolo.</p> <p>- (EBN/IT) 26/10/2008 1 ind. Lonate Pozzolo (P.Alberti, A.Nicoli).</p> <p>- (Laddaga L., Casale F., 2014) 14/11/1996 1 ind. Palude Brabbia (A.Viganò dati ined.).</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) definito principalmente di passo. Sono segnalate catture non documentate nei dintorni dei laghi o lungo i boschi del Ticino, secondo il Martorelli, ed in Palude Brabbia e Bevera.</p>		
190	Civetta capogrosso <i>Aegolius funereus</i>	Ast	Stor.	- (Bianchi et al. 1973) viene segnalata la presenza sui nostri monti poiché ogni anno regolarmente rinvenuti soggetti portati ad imbalsamare, probabile catture roccoli dell' alto Varesotto durante gli erratismi autunnali.		
	<b>CAPRIMULGIFORMES</b> <b>CAPRIMULGIDAE</b>					
191	Succiacapre <i>Caprimulgus europaeus</i>	M B	Poco freq.	<p>- Zone boschive e brughiere, in particolare nelle parte meridionale della provincia (Lonate Pozzolo, Vizzola Ticino, Samarate), dove si riscontra una densità tra le più elevate a livello europeo.</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>- (Ornitho) 11/06/2012 1 ind. Lonate Pozzolo, nido contenente uova o piccoli (G.Bogliani).</p>	F	2012

Nr	LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017  Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia		Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.	Freq. oss.	NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE	NID. GR.	NID. Ult. anno nidif. certa
<b>APODIFORMES</b> <b>APODIDAE</b>							
192	Rondone comune	<i>Apus apus</i>	M B	Freq.	- I primi arrivi a fine marzo con punte massime dalla seconda metà di aprile alla prima metà di maggio e la quasi totalità delle partenze nella seconda metà del mese di luglio.	C	2017
193	Rondone pallido	<i>Apus pallidus</i>	M Bst	Rara	- (Ornitho) numero limitato di osservazioni periodo da marzo a ottobre. ●Note nidificazione: - (Viganò & Schirru, 1995) anno 1994 osservazioni in ore crepuscolari al Battistero S. Vittore di Varese : 2/09/1994 3 coppie, 5/09/1994 3 coppie, 20/09/1994 2 coppie, 28/09/1994 1 coppia, 10/10/1994 uditi pigolii emessi dai giovani provenienti dal foro utilizzato dall' unica coppia rimasta. Ultima segnalazione il 12/10/1994 1 ind. in volo P.za Monte Grappa.	B	1994
194	Rondone maggiore	<i>Apus melba</i>	M B	Freq.	- In alcuni centri urbani, in particolare Varese, Somma Lombardo, Gallarate, Samarate, Vergiate.	C	2017
<b>CORACIFORMES</b> <b>ALCEDINIDAE</b>							
195	Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	S B M W	Freq.	●Note nidificazione: '- (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie viene censita con classe di abbondanza rara, la necessità di scegliere acque relativamente pulite per la ricerca delle prede abituali ne limita la presenza.	C	2017
<b>CORACIFORMES</b> <b>MEROPIIDAE</b>							
196	Gruccione	<i>Merops apiaster</i>	M B	Poco freq.	- Osservato quasi esclusivamente nel periodo aprile-settembre con punte nei mesi di maggio e agosto. ●Note nidificazione: - (G.I.O.) Le recenti nidificazioni sono tutte relative a delle località nei pressi di Arcisate e Lonate Pozzolo.	C	2014
<b>CORACIFORMES</b> <b>CORACIIDAE</b>							
197	Ghiandaia marina	<i>Coracias garrulus</i>	M Bst	Rara	- (Ornitho) 17/08/2017 1 ind. Lonate Pozzolo (M.Pisoni rif. F.Casale), 18 e 19/05/2017 1 ind. f. Lonate Pozzolo (F.Bergo, F.Lorenzini et al.), 26/08/2016 1 ind. Ferno (S.Daverio), 18-22-24/05/2013 1-2 indd. Cardano al Campo (S.Daverio), 9/07/2012 1 ind. Lonate Pozzolo (S.Daverio), 9/05/2012 1 ind. Lonate Pozzolo (S.Daverio), 22-23/05/2011 1 ind. Lonate Pozzolo (F.Casale, R.Moneta), 22/08/2010 1 ind. Lonate Pozzolo (A.Nicoli). - (EBN/BL) 21/08/2010 1 ind. juv. Lonate Pozzolo (C.Dell'Acqua). - (EBN/an2005) 30/05/2005 1 ind. Cairate (C.Dell'Acqua). - (EBN/an2004) 18/05/2004 1 ind. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (C.Dell'Acqua). - (A.Viganò rif.) maggio inizi anni 2000 1 ind. Palude Brabbia. - (Bianchi et al. 1973) definita di passo regolare, molto scarsa. 9/5/1968 1 ind. osservato posato sui fili di recinzione dell' aereoporto della Malpensa. ●Note nidificazione: - (Bianchi et al. 1973) definita irregolarmente nidificante. Viene indicata senza una località precisa la segnalazione, effettuata da alcuni guardiacaccia, dell' avvenuta nidificazione nei buchi dei muri di alcuni frutteti.	B	anni 60'
<b>CORACIFORMES</b> <b>UPUPIDAE</b>							
198	Upupa	<i>Upupa epops</i>	M B	Poco freq.	- Presenze tutte relative al periodo primaverile-estivo, più frequentemente osservato nei mesi di aprile maggio luglio.	F	2017

Nr	<p style="text-align: center;">LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p style="text-align: center;">Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>		<p style="text-align: center;">Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p style="text-align: center;">Freq. oss.</p>	<p>NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">NID. GR.</p>	<p style="text-align: center;">NID. Ult. anno nidif. certa</p>
	<p>PICIFORMES                      PICIDAE</p>						
199	Torcicollo	<i>Jynx torquilla</i>	M B	Poco freq.	- Le osservazioni più frequenti sono relative ai mesi di aprile maggio agosto e settembre. ●Note nidificazione: - (Gagliardi et al. 2007) ricerca 2003/2005 la specie viene censita con classe di abbondanza rara con presenza scarsa e molto localizzata, la popolazione risente del trend negativo a livello italiano e europeo.	E	2005
200	Picchio verde	<i>Picus viridis</i>	S B	Molto freq.		C	2017
201	Picchio nero	<i>Dryocopus martius</i>	S B	Freq.	- Tutti i dati post 2005 confermano una graduale espansione territoriale e spostamenti ad altitudini più basse - (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie risulta ancora localizzata nel settore montano tra 400 e 1400 m di quota. - (Bianchi et al. 1973) "Ai nostri giorni questa specie sembra essere assente dalle prealpi Varesine. Nel periodo dell' ultima guerra mondiale, nel suo dopoguerra e fin verso il 1956, cioè nel massimo dell' evoluzione del "cancro del castagno" , notammo personalmente nei boschi del comprensorio del Campo dei Fiori diversi soggetti in ogni stagione dell' anno compresa l' invernale". ●Note nidificazione: - (Saporetto F. et al. 2011) durante l'indagine 2008-2012 del Gruppo Insubrico di Ornitologia nel 2009 viene documentata la prima nidificazione nel Parco del Ticino e nel 2010 nei boschi igrofili del Lago di Varese. - (S.Colaone rif.) nel 2006 accertata la prima nidificazione nel Parco Pineta di Appiano Gentile -Tradate. - (Parnell et al. 1994) dopo le note di Bianchi et al.1973, la prima nidificazione nota in provincia risale al 1993 a Montegrino Valtravaglia.	C	2017
202	Picchio rosso maggiore	<i>Dendrocopus major</i>	S B	Molto freq.		C	2017
203	Picchio rosso mezzano	<i>Dendrocopus medius</i>	Ast1	Stor.	- (Vigorita e Reguzzoni 1987) secondo semestre del 1987, 1 ind. catturato e inanellato nella stazione di inanellamento di Torrascia (Cadegliano Viconago).		
204	Picchio rosso minore	<i>Dendrocopus minor</i>	S B	Freq.		C	2017
	<p>PASSERIFORMES                      ALAUDIDAE</p>						
205	Calandrella	<i>Calandrella brachydactyla</i>	A2 (1)	Molto rara	- (Ornitho) dal 30/04 al 6/05/2017 >2 indd. Brebbia (L.Giussani et al.). - (Bianchi et al. 1973) 6/05/1965 5 indd. più altri gruppi nei campi arati osservati dagli autori nei dintorni della Malpensa. Viene anche segnalata un' altra osservazione relativa al 1965, ma sponda Novarese del Ticino.		

Nr	LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017  Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia	Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.	Freq. oss.	NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE	NID. GR.	NID. Ult. anno nidif. certa
206	Cappellaccia <i>Galerida cristata</i>	M B	Rara	- Pochissime le recenti osservazioni, tutte relative ad alcune zone nei territori comunali di Busto Arsizio e Lonate Pozzolo. - (Ornitho) 5/05/2016 1 ind. Lonate Pozzolo (L.Giussani), 18/06/2012 1 ind. Lonate Pozzolo (S.Daverio), 5/04/2010 1 ind. Busto Arsizio (G.Papale). - (G.Papale rif.) 2/11/2007 - 28/03/2005 - 22/01/2005 - 29/11/2004 - 7/06/2004 - 2/04/2004 segnalati alcuni indd. (max 5) nei dintorni di Busto Arsizio. - (Bianchi et al. 1973) definita di passo, insolitamente rara. "Durante il decennio 1950-60, nei territori di Cardano al Campo, osservammo e catturammo un solo individuo di cappellaccia. Infine il 1/05/1964 nella Baraggia Bustocca potemmo vedere una coppia su un arato". ●Note nidificazione: - (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie viene censita con classe di abbondanza rara e segnalata unicamente all' interno del territorio comunale di Busto Arsizio.	E	2005
207	Tottavilla <i>Lullula arborea</i>	M Wirr	Rara	- Poche osservazioni, più frequentemente relative ai mesi autunnali. - (Bianchi et al. 1973) definita specie regolare di passo ma non numerosa.		
208	Allodola <i>Alauda arvensis</i>	M Wirr B S?	Poco freq.	- Specie essenzialmente migratrice, non si esclude qualche individuo sedentario in particolare nella parte sud orientale della provincia. ●Note nidificazione: - (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 individuati due nuclei riproduttivi distinti: il primo all' estremo nord della provincia, il secondo concentrato nella parte sud-orientale in cui si trovano le sezioni con le maggiori classi di frequenza.	D	2005
209	Allodola golagiulla <i>Eremophila alpestris</i>	Ast1	Stor.	- (Bianchi et al. 1973) 6/11/1960, unica segnalazione conosciuta 1 ind. f. catturata nei dintorni di Saronno (comunicaz. prof. E. Moltoni).		
	<b>PASSERIFORMES</b> <b>HIRUNDINIDAE</b>					
210	Topino <i>Riparia riparia</i>	M B	Poco freq.	- Le osservazioni più frequenti sono relative al periodo primaverile. ●Note nidificazione: - (F.Casale rif.) 20/05/2007 circa 15 indd. e 7 nidi occupati fiume Ticino Somma Lombardo. - (Guenzani & Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 : Porto della Torre - Colonia nidificante in una cava vicino al Ticino. - (Bianchi et al. 1973) segnalato nidificante in numerose cave del fiume Ticino.	F	2007
211	Rondine montana <i>Ptyonoprogne rupestris</i>	M W S B	Freq.	- Specie migratrice e sedentaria solo parzialmente in particolare nella parte settentrionale della provincia.	C	2017
212	Rondine <i>Hirundo rustica</i>	M B	Molto freq.	- I primi arrivi sono relativi al mese di marzo con punte massime ad aprile e la quasi totalità delle partenze in agosto e settembre. Le osservazioni di ottobre sono quasi tutte riconducibili a individui in migrazione.	C	2017
213	Balestruccio <i>Delichon urbica</i>	M B	Freq.	- Mesi di presenza da marzo a ottobre.	C	2017
214	Rondine rossiccia <i>Cecropis daurica</i>	A5 (5)	Molto rara	- (Ornitho) 25/04/2017 1 ind. Rancio Valcuvia (M.Bergomi, A.Pentassuglia), 11/05/2016 1 ind. Germignaga (M.Viganò), 2-3/05/2015 1 ind. foce Tresa Germignaga (F.Saporetti, L.Nigro). - (Cucè 2010 et al.) anno 2010 1 ind. catturato nella St. Ornitologica Dogana Vizzola Ticino. - (Ornitho) 9-11-12/09/2003 1 ind. Biandronno (L.Giussani).		

Nr	<p>LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p>Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>		<p>Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p>Freq. oss.</p>	<p>NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p>NID. GR.</p>	<p>NID. Ult. anno nidif. certa</p>
	<p>PASSERIFORMES      MOTACILLIDAE</p>						
215	Calandro maggiore	<i>Anthus richardi</i>	A2 (1)	Molto rara	- (Ornitho) 14/10/2015 1 ind. Ternate (L.Giussani). - (Monti 1845) settembre 1843 un individuo preso a Travedona. Viene indicata anche una segnalazione senza data di una cattura avvenuta nelle brughiere di Varese (rif. Prof. Balsamo Crivelli).		
216	Calandro	<i>Anthus campestris</i>	M B?	Rara	- Osservazioni quasi esclusivamente nei mesi di aprile, maggio, giugno. - (Bianchi et al. 1973) "lo osservammo la prima volta il 22/04/1965 alla fattoria Caproni (Malpensa), si trattava di un gruppetto di 5 individui attivissimi sul terreno spoglio; da allora ci interessammo a questa specie e la incontrammo un pò ovunque fosse l' ambiente adatto". ●Note nidificazione: - (Cambi in Brichetti & Fasola 1990) in riferimento alla ricerca 1983-1987 e' stata considerata nidificante "certa" nel testo della pubblicazione e nidificante "probabile" nella carta di distribuzione. Da ulteriori verifiche e' risultata corretta l' indicazione della nidificazione "probabile".	X	
217	Prispolone	<i>Anthus trivialis</i>	M B	Freq.	- Osservazioni da aprile a ottobre con punte massime nei mesi di aprile e settembre.	C	2017
218	Pispola	<i>Anthus pratensis</i>	M W	Freq.	- La quasi totalità delle osservazioni si riferisce a zone aperte di pianura (campi e prati), dove si sposta a gruppetti.		
219	Pispola golarossa	<i>Anthus cervinus</i>	M	Rara	- (Ornitho) la quasi totalità delle osservazioni è relativa ai mesi di aprile maggio.		
220	Spioncello	<i>Anthus spinoletta</i>	M W	Freq.	- La gran parte delle osservazioni si riferisce a zone di pianura aperte; la specie si sposta solitamente a piccoli gruppi e predilige le aree circostanti le zone umide.		
221	Cutrettola	<i>Motacilla flava</i>	M Bst	Freq.	- Punta massime delle osservazioni mesi di aprile, maggio e settembre. ●Note nidificazione: - (Bianchi et al. 1973) indicata come unica ssp. nidificante la ssp. cinerocapilla. Nei decenni scorsi era presente una colonia allo sbocco del canale Brabbia (ult. riscontro nidif. 9/07/1964 ad. con imbeccata), colonie ormai scomparse esistevano sul Lago Maggiore.	B	1964
222	Cutrettola testagialla orientale	<i>Motacilla citreola</i>	A2 (2)	Molto rara	- (Ornitho) 1-2/10/2013 1 ind. 1cy Ispra (L.Giussani et al.). - (EBN/BL) 22/04/2008 1 ind. m. in abito riproduttivo loc. Vasconi Arnetta Lonate Pozzolo (A.Nicoli).		
223	Ballerina gialla	<i>Motacilla cinerea</i>	S B M W	Freq.	- Numero massimo di presenze nel periodo primaverile e autunnale/invernale, quando agli individui residenti si aggiungono quelli in migrazione.	C	2016
224	Ballerina bianca	<i>Motacilla alba</i>	S B M W	Molto freq.	- Numero massimo di presenze nel periodo primaverile e autunnale/invernale, quando agli individui residenti si aggiungono quelli in migrazione.	C	2017



Nr	LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017  Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia		Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.	Freq. oss.	NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE	NID. GR.	NID. Ult. anno nidif. certa
<b>PASSERIFORMES BOMBYCILLIDAE</b>							
225	Beccofrusone	<i>Bombycilla garrulus</i>	M Wirr	Rara	- Le osservazioni normalmente si riferiscono ad invasioni che la specie nel periodo invernale in alcuni anni compie verso il Sud Ovest dell' Europa. - (Ornitho) 18/03/2009 6 indd. Besozzo (L.Prada), 20/02/2009 1 ind. Cremonaga (B.Sommerhalder), 13/01/2009 1 ind. Busto Arsizio (G.Papale), 21/02/2005 >10 indd. Varese (L.Colombo), 23/01/2005 >1 ind. Ternate e 15/01/2005 3 indd. Besozzo (L.Giussani). - (EBN/an2005) 7/04/2005 50 indd. Castelveccana (A.Boto), 12/03/2005 50 indd. Cremonaga (F.Saporetti). - (EBN/IT) 28/04/2005 2 indd. Masnago VA (L.Marocchi).		
<b>PASSERIFORMES CINCLIDAE</b>							
226	Merlo acquaiolo	<i>Cinclus cinclus</i>	S B	Freq.		C	2016
<b>PASSERIFORMES TROGLODYTIDAE</b>							
227	Scricciolo	<i>Troglodytes troglodytes</i>	S B M W	Molto freq.	- Numero massimo di presenze nel periodo autunnale-invernale.	C	2017
<b>PASSERIFORMES PRUNELLIDAE</b>							
228	Passera scopaiola	<i>Prunella modularis</i>	M W B? Bst	Freq.	- La quasi totalità delle osservazioni è relativa al periodo da ottobre a marzo, con punte massime nei mesi di dicembre e gennaio. ●Note nidificazione: - (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie è risultata presente esclusivamente nella parte montana con una piccola popolazione e con indice frequenza basso. Nel periodo di ricerca solo dati di nidificazione probabile. - (Brichetti & Fasola 1990) ha nidificato nella regione alpina dal Varesotto alla provincia di Brescia (R.Lardelli). - (Guenzani & Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 nidificazione certa in 3 tavolette IGM 1:25.000 nel settore montano della provincia. - (Realini 1988a) 12/07/1980 nido su abete rosso Monte Sette Termini, 24/06/1978 juv. che ha appena lasciato il nido Forcora.	A	1987
229	Sordone	<i>Prunella collaris</i>	M W	Poco freq.	- La quasi totalità delle osservazioni si riferisce al massiccio del Campo dei Fiori/Sacro Monte; pochissime segnalazioni in altre zone montane della provincia.		
<b>PASSERIFORMES TURDIDAE</b>							
230	Pettiroso	<i>Erithacus rubecula</i>	S B M W	Molto freq.	- Periodo di maggior presenza nei mesi autunnali e invernali.	C	2017
231	Usignolo maggiore	<i>Luscinia luscinia</i>	A2 (1)	Molto rara	- (Boto et al., 2005) 17/09/2004 1 ind. 1cy catturato alla Stazione di Inanellamento della Palude Brabbia (Ternate). - (Fornasari L., 2003) 1 ind. catturato nell' autunno 2000 nella Staz. Ornitologica Brughiera del Dosso Somma lombardo.		
232	Usignolo	<i>Luscinia megarhynchos</i>	M B	Freq.		C	2011

Nr	<p>LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p>Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>		<p>Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p>Freq. oss.</p>	<p>NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p>NID. GR.</p>	<p>NID. Ult. anno nidif. certa</p>
233	Pettazzurro	<i>Luscinia svecica</i>	M	Rara	<p>- Osservazioni solitamente nel periodo di fine estate e inizio autunno, in particolare Palude Brabbia e nella vegetazione rivierasca del Lago Maggiore (Ispra, Monvalle).</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) definita specie scarsa ma costante. "Capita quasi ogni anno più facilmente in settembre che in primavera, nelle località palustri ricche di folta vegetazione, di salici e ontani".</p>		
234	Codirosso spazzacamino	<i>Phoenicurus ochruros</i>	S B M W	Molto freq.		C	2017
235	Codirosso comune	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	M B	Freq.	<p>- Osservazioni da fine marzo a inizio ottobre, con punte a aprile e maggio.</p>	C	2017
236	Stiaccino	<i>Saxicola rubetra</i>	M B	Freq.	<p>●Note nidificazione: - (Gagliardi et al. 2007) ricerca 2003/2005 la specie viene censita con classe di abbondanza "rara" con presenza localizzata in alcune aree montane settentrionali del territorio.</p>	E	2005
237	Saltimpalo	<i>Saxicola torquata</i>	M Wirr S B	Poco freq.	<p>- Specie essenzialmente migratrice e sedentaria solo parzialmente, in particolare in alcune zone centrali e meridionali della provincia.</p> <p>●Note nidificazione: - (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie viene censita con classe di abbondanza localizzata, diffusione omogenea nei settori centrali e meridionali della provincia, livello di diffusione più alto nella sezione di Saronno.</p>	D	2005
238	Culbianco	<i>Oenanthe oenanthe</i>	M Bst	Freq.	<p>- Punte massime delle osservazioni mesi di aprile, maggio e settembre.</p> <p>●Note nidificazione: - (Guenzani &amp; Saporetto, 1988) nella ricerca 1983/1987 rilevata un'unica nidificazione sul Monte Paglione (Val Veddasca), in prossimità del confine svizzero. - (Realini 1982) "Segnalato per la prima volta come nidificante nella nostra provincia da C.Croci, secondo il quale sul Forcora nidifica qualche coppia ogni anno".</p>	B	1987
239	Monachella	<i>Oenanthe hispanica</i>	A? (1) Bst	Molto rara	<p>- (Ornitho) 17/04/2016 1 ind. f. Ferno (S.Daverio).</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) definita di passo, poco abbondante e non uniformemente distribuita nel territorio della provincia. Più facile osservarla durante il passo primaverile, scarsa in autunno. Osservata dagli autori solo 2 volte a maggio (anno non precisato) nei pressi della Malpensa.</p> <p>●Note nidificazione: - (Bianchi et al. 1973) definita in diminuzione notevole come nidificante. Rare coppie nidificanti negli anfratti rocciosi della Valganna, del S. Martino, dei Pizzoni di Laveno e del Monte Nudo.</p>	B	anni 60'

Nr	<p>LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p>Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>	<p>Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p>Freq. oss.</p>	<p>NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p>NID. GR.</p>	<p>NID. Ult. anno nidif. certa</p>
240	<p>Codirossone <i>Monticola saxatilis</i></p>	M B	Rara	<p>- (Ornitho) nel periodo primaverile-estivo anni 2016 e 2017 alcune osservazioni nella parte centro-settentrionale della provincia (oss.vari), 10/05/2012 1 ind. Val Veddasca (A.Gagliardi), 16/04/2012 1 ind. Lonate Pozzolo (S.Daverio), 9-22-23/05/2010 1-2 indd. Val Veddasca (F.Saporetti, M.Tomasi). - (Bianchi et al. 1973) definita specie comune, mai abbondante, stazionaria, nidificante, di passo ed estivante. ●Note nidificazione: - (G.I.O.) Anno 2017 - Prima conferma nid.certa post 1987: Alta Veddasca 11/06/2017 m. ad. con imbeccata (M.Viganò, A.Pentassuglia, M.Bergomi), 18/06/2017 m. ad. con imbeccata (L.Nigro), 22/07/2017 f. ad. imbecca un juv. già uscito dal nido (L.Giussani, R.Aletti). - (Guenzani &amp; Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 nidificazione certa in 4 tavolette IGM 1:25.000 della parte settentrionale della provincia. Settore Val Veddasca, Pizzoni di Laveno, Campo dei Fiori e cave di Arcisate, Besano e Viggìù. - (Bianchi et al. 1973) viene indicato come discretamente nidificante nella zona di S.Caterina del Sasso, sui Pizzoni di Laveno 3-4 coppie annualmente. Nidificava in passato al "Sasso Galletto", ai "Caldè", S.Antonio, Cuvignone, al "Battistone", a Vararo lungo le pareti rocciose, Monte Nudo, Monti di Montegrino, sui monti di Maccagno e della Val Veddasca, qualche coppia sui monti di Boarezzo, della Valganna e a nord del Campo dei Fiori. Progressivamente diminuito negli ultimi 20 anni, vengono stimate circa 10 coppie nidificanti in totale (generalmente effettua 2 covate).</p>	F	2017
241	<p>Passero solitario <i>Monticola solitarius</i></p>	M Wrr S? B	Rara	<p>- (Ornitho) aprile/dicembre 2017 2-3 indd. alta provincia, aprile/dicembre 2016 1-2 indd. parte centro-settentrionale della provincia (oss.vari), aprile/giugno 2015 2 indd. alta provincia (W.Guenzani et al.), maggio/giugno 2014 2 indd. alta provincia (M.Carabella, F.Pianezza et al.). - (A.Viganò rif.) anno 1994 1 ind. Varese, torre Basilica San. Vittore. - (Bianchi et al. 1973) definita specie sedentaria sparsa un pò ovunque nell'Alto Varesotto. ●Note nidificazione: - (Ornitho) giugno 2017 nidificazione di una coppia in alta provincia (C.Parnell, R.Aletti), maggio 2014 nidificazione di una coppia in alta provincia (M.Carabella, F.Pianezza et al.), anni 2015 2016 solo dati di nidificazione probabile. - (Realini 1978) 24/06/1978, nido con piccoli Val Veddasca. - (Bianchi et al. 1973) "Ne vediamo ogni anno una coppia su una parete a picco del S.Martino, due coppie in aprile - maggio al "Sasso Galletto" ed ai "Parèe" sotto il Monte della Croce verso Vararo. Nidifica inoltre abbastanza spesso sulle pareti rocciose lungo la strada tra Maccagno e Pino. Abbiamo trovata la coppia perfino col nido nel muraglione di sostegno della ferrovia Laveno-Pino-Gottardo".</p>	F	2017
242	<p>Tordo dorato <i>Zoothera dauma</i></p>	Ast1	Stor.	<p>- (Bianchi et al. 1973) 26/10/1966 1 ind. catturato nella uccellanda dell'avv. Steno Baj a Cantello, poi donato al Museo di Storia Naturale di Milano.</p>		
243	<p>Merlo dal collare <i>Turdus torquatus</i></p>	M Bst	Rara	<p>- (Ornitho) 6 e 7/11/2017 2 indd. ssp torquatus Brebbia (L.Giussani et al.), 3/04/2016 &gt;1 ind. Veddasca (L.Colombo, L.Giussani, L.Nigro), 26/05/2012 1 ind. Dumenza (M.Carabella, F.Pianezza), 10/04/2012 1 ind. Somma Lombardo (S.Daverio), 8-10/10/2010 1 ind. Malpensa Ferno (A.Vidolini). - (Realini 1978) 28/06/1978 nido con piccoli (Veddasca). - (Bianchi et al. 1973) definito molto raro in pianura, dove compare talvolta nel tardo ottobre. Ott. 1961 1 ind. ucciso a Montegrino Valtravaglia, 18/10/31 1 ind. m. e 1 ind. f. Varesotto (note pers. prof. E.Moltoni). ●Note nidificazione: - (Realini 1978) 28/06/1978 rinvenimento nido con piccoli nei pressi della Forcora (Veddasca). Prima e unica nidificazione accertata.</p>	B	1978
244	<p>Merlo <i>Turdus merula</i></p>	S B M W	Molto freq.		C	2017

LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017		Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.	Freq. oss.	NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE	NID. GR.	NID. Ult. anno nidif. certa
Nr	Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia					
245	Cesena fosca <i>Turdus eunomus</i>	Ast2	Stor.	- (Bianchi et al. 1973) due segnalazioni nei pressi della colonia S. Paolo di Marchirolo: fine dic. 1937 5 indd., 30/12/1952 2 indd. (2 soggetti catturati).		
246	Cesena <i>Turdus pilaris</i>	M W	Freq.	- Specie tipicamente gregaria, si sposta in gruppi sia in pianura che in montagna. Si ciba volentieri di cachi lasciati sugli alberi.		
247	Tordo bottaccio <i>Turdus philomelus</i>	M W S B	Freq.	- Specie essenzialmente migratrice, qualche individuo sedentario nel settore collinare e montano della provincia.	C	2017
248	Tordo sassello <i>Turdus iliacus</i>	M W Bst	Poco freq.	- Specie piuttosto gregaria, si sposta a gruppi sia in pianura che in montagna. ●Note nidificazione: - (Bianchi et al. 1973) Vengono segnalati due casi: la prima nidificazione provinciale conosciuta risalente all' agosto del 1944 sul Monte Orsa (E.Conti e L.Olgiati) e giugno 1960 in località "Pianazzo Fontana Rossa" sul versante nord del Campo dei Fori (A.Barbieri).	B	1960
249	Tordela <i>Turdus viscivorus</i>	M Wirr S? B	Poco freq.	- Possibile qualche individuo stazionario nella parte settentrionale montana della provincia. ●Note nidificazione: - (Gagliardi et al. 2007) ricerca 2003/2005 la specie viene censita con classe di abbondanza "rara", presente nel settore montano della provincia, alta Val Veddasca, Monte Sette Termini, rilievi della Valganna e marginalmente monte Colonna.	C	2017
PASSERIFORMES SYLVIIDAE						
250	Usignolo di fiume <i>Cettia cetti</i>	S B M W	Freq.	- Essenzialmente sedentario nelle zone palustri e ripariali della provincia. ●Note nidificazione: - (Gagliardi et al. 2007) ricerca 2003/2005 la specie viene censita con classe di abbondanza localizzata, distribuita quasi esclusivamente nella fascia centrale della provincia (Palude Brabbia, Lago di Varese, Lago di Comabbio). Discretamente diffusa anche nella palude Bruschera (Angera) Lago Maggiore.	C	2017
251	Beccamoschino <i>Cisticola juncidis</i>	M B	Rara	- Segnalata in passato come sedentaria parziale e rara di passo, la specie e' in Italia in lieve espansione di areale ma non sul territorio provinciale. - (Ornitho) 8-9-10/10/2010 alcuni indd. Lonate Pozzolo (P.Bonazzi), 15/06/2001 1 ind. brughiera Malpensa Lonate Pozzolo (W.Guenzani, L.Giussani). - (G.Papale rif.) 15/10/2007 1 ind. Palude Brabbia. - (Bianchi et al. 1973) definito molto raro di passo. ●Note nidificazione: - (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 la prima e unica nidificazione è stata registrata nel corso del primo anno di indagine nella parte alta della provincia (sezione di Luino).	E	2005
252	Forapaglie macchiettato <i>Locustella naevia</i>	M	Poco freq.	- Specie di non facile individuazione, le osservazioni si riferiscono ad alcune zone umide in particolare Palude Brabbia e Vasche Arnetta Lonate Pozzolo. - (Laddaga e Casale, 2014): regolare in Palude Brabbia. Presenza rilevata quasi esclusivamente tramite l'inanellamento; 9 indd. nel 2007 (Vigorita et al., 2007), 15 nel 2008 (Vigorita et al., 2008), 2 nel 2009 (Vigorita et al., 2009) e 20 nel 2012 (Gustin, 2013). - (Boto et al., 2005): inanellati 3 indd. ago. 1991, 1 ind. apr. 1992, 2 indd. ago. 1992, 1 ind. il 12/09/1995.		

Nr	<p style="text-align: center;">LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p style="text-align: center;">Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>		<p style="text-align: center;">Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p style="text-align: center;">Freq. oss.</p>	<p style="text-align: center;">NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">NID. GR.</p>	<p style="text-align: center;">NID. Ult. anno nidif. certa</p>
253	Salciaiola	<i>Locustella luscinioides</i>	M B	Poco freq.	<p>- Le principali osservazioni sono relative al periodo da marzo a giugno, in particolare Palude Brabbia.</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>- (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie viene censita con classe di abbondanza rara nella Palude Brabbia. Nel Lago di Biandronno risulta in calo con una sola coppia presente nel corso dell'indagine.</p> <p>- (Saporetto F. 1998) nel 1997/98 la salciaiola é presente con una densità di 5.5 e 4.4 coppie/10 ettari nel settore meridionale della Palude Brabbia.</p>	D	2005
254	Forapaglie castagnolo	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	A4 (3)	Molto rara	<p>- (Ornitho) 16/11/2014 1 ind. Lonate Pozzolo (A.Nicoli, C.Dell'Acqua et al.), 3/01/2013 1 ind. Ternate (L.Laddaga, A.Martinoli).</p> <p>- (F.Casale rif.) 4/03/2007 1 ind. loc. Bruschera Angera.</p> <p>- (Faralli U., Casale F., 1995) 28/04/1995 1 ind. Palude Brabbia (A.Viganò).</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) definita specie non comune e difficile da osservarsi.</p>		
255	Pagliarolo	<i>Acrocephalus paludicola</i>	A1 (1)	Molto rara	<p>- (Ornitho) 30/04/2016 1 ind. Germignaga (M.Viganò et al.).</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) citata ma senza prove certe sul territorio della provincia.</p>		
256	Forapaglie comune	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	M	Poco freq.	<p>- Specie di non facile individuazione, la quasi totalità delle osservazioni si riferisce ai periodi aprile/maggio e agosto/ottobre.</p>		
257	Cannaiola verdo gnola	<i>Acrocephalus palustris</i>	M B	Poco freq.	<p>- Osservazioni da marzo a ottobre, con punte a maggio e giugno. Meno frequente della cannaiola comune, spesso confusa con quest'ultima in assenza di emissioni canore.</p>	C	2012
258	Cannaiola comune	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	M B	Freq.	<p>- Osservazioni da marzo a ottobre, con punte a maggio e giugno.</p>	C	2017
259	Cannareccione	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	M B	Freq.	<p>- Osservazioni principalmente da aprile a settembre, con punte a maggio e giugno.</p>	C	2017
260	Canapino maggiore	<i>Hippolais icterina</i>	M	Rara	<p>- Le poche osservazioni si riferiscono ai mesi di aprile, maggio, agosto e settembre.</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) definito visitatore estivo nidificante raro. Due maschi in canto nei mesi di maggio 1969 e giugno 1967.</p> <p>La specie in questa lista non viene definita "nidificante storica" perché gli unici dati reperiti non confermano con certezza l'avvenuta nidificazione in tempi passati.</p>		
261	Canapino comune	<i>Hippolais polyglotta</i>	M B	Poco freq.	<p>- La quasi totalità delle osservazioni è relativa ai mesi di aprile, maggio, giugno.</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>- (Ornitho) 20/06/2010 alcuni indd. Lonate Pozzolo, adulto che trasporta il cibo per i piccoli durante il suo periodo di nidificazione (A.Nicoli) - prima nidificazione documentata a livello provinciale in questo secolo .</p>	F	2010
262	Capinera	<i>Sylvia atricapilla</i>	S B M W	Molto freq.	<p>- Numero massimo di presenze nel periodo migratorio primaverile (superiore a quello autunnale), punte massime aprile e maggio.</p>	C	2017

Nr	<p>LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p>Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>		<p>Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p>Freq. oss.</p>	<p>NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p>NID. GR.</p>	<p>NID. Ult. anno nidif. certa</p>
263	Beccafico	<i>Sylvia borin</i>	M B	Poco freq.	<p>- Osservazioni nei mesi primaverili / estivi.</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>- (Ornitho) 10/07/2011 3 indd. Val Veddasca, adulto che trasporta il cibo per i piccoli durante il suo periodo di nidificazione - prima nidificazione accertata a livello provinciale post 2000 (F.Saporetti).</p> <p>- (Bianchi et al. 1973): ritiene probabile che la specie nidifichi regolarmente in zone collinari-montane.</p>	F	2011
264	Bigia padovana	<i>Sylvia nisoria</i>	A1 (1)	Molto rara	<p>- (Ornitho) 9/10/2010 1 ind. Palude Brabbia (A.Boto).</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) definita rara di passo, forse anche nidificante. "I dati conosciuti si riferiscono alle catture effettuate nell' Uccellanda della Beverina (Besozzo), che inanellò per conto dell' osservatorio del Garda dal 1932 al 1939" (dati non reperiti).</p>		
265	Bigiarella	<i>Sylvia curruca</i>	M	Poco freq.	<p>- Osservazioni in particolare nei mesi di aprile, maggio, agosto, settembre.</p>		
266	Bigia grossa	<i>Sylvia hortensis</i>	A? (2)	Molto rara	<p>- (Casale 2015) 5/06/2011 1 ind. in canto Somma Lombardo.</p> <p>- (EBN/BL) 15/09/2005 1 ind. Germignaga (M.Viganò).</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) definita poco comune di passo. 24/8/1959 1 ind. Morosolo. In alcune uccellande della provincia 46 catture note in 7 anni, quasi tutti individui isolati.</p>		
267	Sterpazzola	<i>Sylvia communis</i>	M B	Poco freq.	<p>- Le principali osservazioni sono relative ai mesi di aprile maggio agosto e settembre.</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>- (Gagliardi et al. 2007) ricerca 2003/2005 la specie viene censita con classe di abbondanza rara. Presente una piccola popolazione in progressivo decremento distribuita sul territorio provinciale in tre nuclei isolati tra loro.</p>	D	2005
268	Magnanina comune	<i>Sylvia undata</i>	A3 (3)	Molto rara	<p>- (Ornitho) dal 13 al 22/01/2017 &gt;1 ind. m.ad. Lonate Pozzolo (F.Bergo, F.Lorenzini et al.), 25/02/2016 1 ind. Lonate Pozzolo (G.Chiantante).</p> <p>- (EBN/BL) 4/11/2007 1 ind. brughiera Arnetta Lonate Pozzolo (C.Dell'Acqua).</p>		
269	Sterpazzolina comune	<i>Sylvia cantillans</i>	M B? Bst	Rara	<p>- (Ornitho) poche segnalazioni presenti, solitamente indd. isolati osservati nel periodo primaverile.</p> <p>- (A.Boto rif.) 7/04/2006 1 ind. f. juv. catturata alla Stazione Inanellamento Palude Brabbia Ternate.</p> <p>- (EBN/BL) 26/03/2006 1 ind. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (C.Dell'Acqua).</p> <p>- (M. Viganò rif.) 20/04/2005 1 ind. Germignaga.</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>- (Realini 1979) - Luglio 1978 Forcora (Veddasca). Viene segnalato l'incontro di alcuni indd. juv che avevano lasciato il nido da una quindicina di giorni.</p>	A	1978
270	Occhiocotto	<i>Sylvia melanocephala</i>	Ast1	Stor.	<p>- (Bianchi et al. 1973) definito accidentale. 15/11/1898 1 ind. f. ad. Varese (coll. Arrigoni degli Oddi) (cfr. Ornis, vol. IX,1898,p. 212) (citazione prof. Moltoni 1959).</p>		
271	Lù forestiero	<i>Phylloscopus inornatus</i>	A5 (5)	Molto rara	<p>- (Ornitho) 7/11/2017 1 ind. Palude Brabbia (L.Favretto), 13/11/2015 1 ind. Golasecca (F.Casale), 25/10/2015 1 ind. Somma Lombardo (F.Casale), 6/10/2014 1 ind. inanellato Palude Brabbia (G.Soldato).</p> <p>- (EBN/an2007) 2/10/2007 1 ind. Palude Brabbia (M.Nicastro, R.Garavaglia et al./I.N.F.S.).</p>		

Nr	<p>LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p>Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>		<p>Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p>Freq. oss.</p>	<p>NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p>NID. GR.</p>	<p>NID. Ult. anno nidif. certa</p>
272	Lui di Radde	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	A1 (1)	Molto rara	- (Ornitho) 13/10/2013 1 ind. Palude Brabbia, catturato e inanellato da Stefano Costa all'interno della Riserva Integrale - tutte le misure biometriche e la formula alare corrispondono. Corpo robusto, quasi da non sembrare neanche un lui. Tarso massiccio, messo un anello A anzichè il solito X. Becco molto largo alla base. Sottocoda giallo. Timoniere "giovanili" (M.Baietto). (N.d.R.) Segnalazione in attesa omologazione COI-GSR.		
273	Lui bianco	<i>Phylloscopus bonelli</i>	M B	Poco freq.	- Principalmente osservato durante la migrazione primaverile nel periodo aprile-giugno. ●Note nidificazione: - (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie viene censita con classe di abbondanza rara, presente nel settore centro-settentrionale della provincia in corrispondenza dei sistemi montuosi calcareo-dolomitici situati tra i Pizzoni di Laveno e il monte Orsa.	D	2005
274	Lui verde	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	M B? Bst	Poco freq.	- Principalmente osservato durante la migrazione primaverile nei mesi di aprile e maggio. ●Note nidificazione: - (Guenzani & Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 nidificazione certa in 3 tavolette IGM 1:25.000. Nel 1986 nidificazione certa in località Molino di Strona a 246 metri s.l.m. - (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie viene individuata come localizzata, con una diffusione sul territorio di coppie isolate e solo in determinati settori montani presenta nuclei con distribuzione più compatta. Nella ricerca riscontrati solo indizi di nidificazione probabile. - (Realini 1979) 24/06/1979: nido con uova, monte Sette Termini.	A	1986
275	Lui piccolo	<i>Phylloscopus collybita</i>	M W S B	Freq.	- Specie sedentaria solo parzialmente negli ambienti boschivi ed ecotonali della provincia. - (Ornitho) raramente segnalata la ssp tristis, dal 2012 presenti max 2 segnalazioni/anno.	C	2015
276	Lui grosso	<i>Phylloscopus trochilus</i>	M	Freq.	- Osservabile negli ambienti boschivi e umidi della provincia durante la migrazione primaverile e autunnale, con punte massime nei mesi di aprile e settembre.		
277	Regolo	<i>Regulus regulus</i>	S B M W	Freq.	- Il numero massimo delle osservazioni è relativo ai mesi di novembre, dicembre e gennaio. ●Note nidificazione: - (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie viene censita con classe di abbondanza localizzata, distribuita uniformemente nel settore montuoso settentrionale e nella parte centro orientale della provincia, assente nel settore meridionale.	C	2017
278	Fiorrancino	<i>Regulus ignicapillus</i>	M W S B	Freq.	- Specie migratrice e sedentaria solo parzialmente in particolare nella parte centro-settentrionale della provincia. ●Note nidificazione: - (Casale 2015) nel 2013 censite 7 coppie nel centro abitato di Somma lombardo, per una densità di 2,2 coppie/kmq (F.Casale).	C	2017
<i>PASSERIFORMES</i>		<i>MUSCICAPIDAE</i>					
279	Pigliamosche	<i>Muscicapa striata</i>	M B	Freq.	- Osservazioni da aprile a settembre con punte massime nei mesi di maggio e giugno.	C	2017

LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017		Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.	Freq. oss.	NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE	NID. GR.	NID. Ult. anno nidif. certa
Nr	Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia					
280	Pigliamosche pettirosso <i>Ficedula parva</i>	A4 (3)	Molto rara	- (Ornitho) 21/03/2015 1 ind. Germignaga (F.Saporetti). - (LIPU "ali" dic. 2014) 4-5/10/2014 1 ind. Palude Brabbia, oss. durante l' edizione dell' Eurobirdwatch. - (EBN/an2003) 15/11/2003 1 ind. m. Oasi LIPU Palude Brabbia (F.Boggiani). - (Moltoni E., 1958) anno 1864 1 ind. catturato a Somma Lombardo entrato a far parte della collezione del Museo di Storia Naturale di Milano con il nr. 2978.		
281	Balia caucasica <i>Ficedula semitorquata</i>	A1 (1)	Molto rara	- (Gustin M., 2015) 23/08/2014 1 ind. inanellato Palude Brabbia.		
282	Balia dal collare <i>Ficedula albicollis</i>	A7 (7)	Molto rara	- (Ornitho) 7/05/2017 1 ind. m.ad. Bruschera Angera (G.I.O.), 25-26-27/04/2017 3 indd. m.ad. + m.2° anno + f.ad. Germignaga (M.Viganò et al.), 19/04/2016 2 indd. m.ad. + f.ad. Inarzo (R.Hummel), 9/05/2013 1 ind. Ternate (L.Laddaga), 15/04/2012 1 ind. m.ad. Bodio Lomnago (L.Prada). - (EBN/BL) 28/09/2008 1 ind. Morosolo (P.e L.Casali). - (Regione Lombardia 2008) 22/04/2008, 1 ind. catturato nella staz. Ornit. Dogana Vizzola Ticino (E.Vallinotto, A.Magnani). - (Bianchi et al. 1973) "nonostante le ricerche fatte presso le uccellande non venne mai trovata".		
283	Balia nera <i>Ficedula hypoleuca</i>	M	Freq.	- Osservabile durante la migrazione nelle zone di pianura e collina costituite da boschi di latifoglie e giardini, di solito più numerosa nella fase migratoria post-riproduttiva con punte massime nei di mesi di agosto settembre.		
PASSERIFORMES TIMALIIDAE						
284	Basettino <i>Panurus biarmicus</i>	A2 (1)	Molto rara	- (Ornitho) Feb. 2001 2 indd. m. e f. Stagno Vanetti Palude Brabbia (L.Giussani). - (W.Guenzani rif.) 1 ind. primavera 1986 Palude Brabbia zona Agricola Paludi.		
285	Panuro di Webb <i>Paradoxornis webbianus</i>	S B Int	Freq.	- Specie introdotta che si è naturalizzata in seguito ad un rilascio di diverse decine di individui nei pressi del Lago di Varese nell'anno 1995. La specie da alcuni anni sta allargando il proprio areale.	F	2017
PASSERIFORMES AEGITHALIDAE						
286	Codibugnolo <i>Aegithalos caudatus</i>	S B M W	Molto freq.		C	2017
PASSERIFORMES PARIDAE						
287	Cinciarella <i>Cyanistes caeruleus</i>	S B M W	Molto freq.		C	2017
288	Cinciallegra <i>Parus major</i>	S B M W	Molto freq.		C	2017
289	Cincia dal ciuffo <i>Lophophanes cristatus</i>	S B	Freq.		C	2017
290	Cincia mora <i>Periparus ater</i>	S B M W	Freq.		C	2017
291	Cincia alpestre <i>Poecile montanus</i>	S B	Poco freq.	- Normalmente osservata nella parte settentrionale della provincia ad altitudini superiori agli 800 mt. ●Note nidificazione: - (Ornitho) 23/05/2013 e 1/07/2013 Sacro Monte di Varese , trasporto materiale e adulti con pulcini - prima nidificazione accertata a livello provinciale in questo secolo. (A.Vidolini).	F	2013



LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017		Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.	Freq. oss.	NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE	NID. GR.	NID. Ult. anno nidif. certa
Nr	Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia					
292	Cincia bigia <i>Poecile palustris</i>	S B M W	Molto freq.		C	2017
PASSERIFORMES SITTIDAE						
293	Picchio muratore <i>Sitta europaea</i>	S B	Freq.		C	2017
PASSERIFORMES TICHODROMADIDAE						
294	Picchio muraiolo <i>Tichodroma muraria</i>	M W	Poco freq.	- Presente nel periodo autunnale-invernale, sempre in numero limitato di individui, su alcune pareti rocciose della parte centro settentrionale della provincia. - (Fornasari et al.,1992) da un'analisi delle tavolette IGM citate risultano nei censimenti svernanti effettuati 1986/87-1990/91 1 osservazione nell'Alto Luinese e 1 sul Monte S. Martino (M.Carabella). - (Viganoni G. 1977) 7/01/1977 1 ind. parete rocciosa Maccagno, 29/12/1973 1 ind. parete rocciosa Maccagno.		
PASSERIFORMES CERTHIIDAE						
295	Rampichino alpestre <i>Certhia familiaris</i>	S B	Poco freq.	- Solitamente osservato nelle zone montuose della nostra provincia ad altitudini superiori ai 700 mt, qualche individuo anche ad altezze inferiori.	C	2015
296	Rampichino comune <i>Certhia brachydactyla</i>	S B	Freq.		C	2017
PASSERIFORMES REMIZIDAE						
297	Pendolino <i>Remiz pendulinus</i>	M W Bst	Poco freq.	- Specie essenzialmente migratrice, non si esclude la localizzata presenza di qualche individuo sedentario. ●Note nidificazione: - (Realini 1982) 1978 e 1979, rinvenimento di un nido (R.Marta) fiume Ticino nei pressi della Caproni a Vizzola Ticino. - (Bianchi et al. 1973) "scarsamente nidificante nella vegetazione di certe lanche impraticabili del Ticino presso Vizzola, in Palude Brabbia verso Inarzo e nel "Bouscasc" in Careggio, Valcuvia".	B	1979
PASSERIFORMES ORIOLIDAE						
298	Rigogolo <i>Oriolus oriolus</i>	M B	Poco freq.	- Le osservazioni più frequenti nei mesi di aprile maggio agosto. ●Note nidificazione: - (Ornitho) 6/07/2012 4 indd. Lonate Pozzolo, adulto che trasporta il cibo per i piccoli durante il suo periodo di nidificazione - prima nidificazione accertata a livello provinciale post 2000 (F.Casale).	F	2012
PASSERIFORMES LANIIDAE						
299	Averla piccola <i>Lanius collurio</i>	M B	Poco freq.	- Presente quasi esclusivamente nel periodo primaverile estivo, maggio il mese con il maggior numero di osservazioni.	C	2012
300	Averla cenerina <i>Lanius minor</i>	A4 (1)	Molto rara	- (Ornitho) 30/05/2004 1 ind. m. Lonate Pozzolo (L.Giussani). - (Bianchi et al. 1973) definita specie un tempo comune, che ha registrato negli ultimi 10 anni un calo numerico più che preoccupante, viene segnalata regolare presenza sino al 1962. "Giunge a stagione avanzata ma con una notevole regolarità". Segnalazioni documentate: 10/05/1965 1 ind. Cardano al Campo, 17/05/1964 2 indd. Ponte Oleggio, 17/05/1962 1 ind. Cardano al Campo.		

LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017		Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.	Freq. oss.	NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE	NID. GR.	NID. Ult. anno nidif. certa
Nr	Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia					
301	Averla maggiore <i>Lanius excubitor</i>	M W	Poco freq.	- Osservata quasi esclusivamente nei mesi autunnali e invernali frequentemente nei pressi di alcune zone umide, in particolare Palude Brabbia e Vasche Arnetta di Lonate Pozzolo.		
302	Averla capirossa <i>Lanius senator</i>	M Bst	Rara	- (Ornitho) 28/05/2016 1 ind. Lonate Pozzolo (F.Bergo, F.Lorenzini), 6-7/05/2016 1 ind. Fagnano Olona (P.Monti et al.), 5/05/2016 1 ind. Lonate Pozzolo (S.Daverio), 16/06/2010 1 ind. Maccagno (R.Lardelli), 28/04/2009 1 ind. m. Lonate Pozzolo (R.Moneta), 26/05/2008 1 ind. nei pressi dell'IPER di Varese (M.Tomasi). - (Bianchi et al. 1973) "specie meno rara di quanto si credesse. Dopo una occasionale cattura di un maschio nel 1957 a Cardano al Campo non incontrammo più averle capirose sino al 1964. Da allora, forse anche perchè si prestò maggiore attenzione, ne incontrammo in quasi ogni località favorevole". ●Note nidificazione: - (Realini 1982) segnala come unico caso quello riscontrato dallo stesso autore ai tempi dell'infanzia: coppia che nidificava regolarmente nei pressi di Ispra.	B	anni 50'
PASSERIFORMES CORVIDAE						
303	Ghiandaia <i>Garrulus glandarius</i>	S B	Molto freq.	- Durante il periodo autunnale alla popolazione residente si possono aggiungere alcuni individui in spostamento migratorio.	C	2017
304	Gazza <i>Pica pica</i>	S B	Molto freq.	- Dall'inizio del secolo in continua espansione sul territorio della provincia.	C	2017
305	Nocciolaia <i>Nucifraga caryocatactes</i>	S? M	Poco freq.	- La quasi totalità delle osservazioni è relativa alle zone montuose della provincia (Campo dei Fiori, Cuvignone, Veddasca) e si riferiscono con ogni probabilità a individui provenienti dalla zona Alpina, dove la specie è sedentaria e nidificante, o a migratori irregolari. - (Bianchi et al. 1973) "qualche individuo è relativamente frequente in autunno nelle pinete e nei noccioli del Campo dei Fiori, del Piambello, della Martica e del Monte Nudo".		
306	Gracchio alpino <i>Pyrrhocorax graculus</i>	Ast2	Stor.	- Sedentario nidificante sulle Alpi è anche migratore irregolare. Le poche osservazioni provinciali del secolo scorso si riferiscono probabilmente a migratori invernali o a fenomeni di erratismo. - (A.Viganò rif.) 30/12/1993 2 indd. Val Viascoletta Alto Luinese. - (Bianchi et al. 1973) definito accidentale, 18/12/1970 1 ind. osservato sostare nel Vallone del Parco Rigamonti a Taino.		
307	Taccola <i>Corvus monedula</i>	S B M?	Freq.	- Non si esclude in aggiunta alla popolazione residente locale qualche individuo erratico o in migrazione.	C	2017
308	Corvo comune <i>Corvus frugilegus</i>	M W	Poco freq.	- Numero massimo di indd. osservati: 28/11/2017 due stormi per un totale di 63 indd. (9 + 54) Rancio Valcuvia (M.Carabella/Ornitho). - La totalità delle osservazioni si riferisce a zone di pianura e fondovalle situate nella parte meridionale della provincia. - (Bianchi et al. 1973) definita di passo e svernante. "Sono quasi scomparsi quegli spettacolari voli di migratori caratteristici della specie ..... il calo numerico è impressionante ..... alcuni individui si attardano sino alla fine di aprile".		

Nr	<p style="text-align: center;">LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p style="text-align: center;">Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>	<p style="text-align: center;">Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p style="text-align: center;">Freq. oss.</p>	<p style="text-align: center;">NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">NID. GR.</p>	<p style="text-align: center;">NID. Ult. anno nidif. certa</p>
309	Cornacchia nera <i>Corvus corone</i>	M W S B	Freq.	- Specie presente in particolare come svernante con individui provenienti dai settori alpini dove la specie e' residente nidificante. ●Note nidificazione: - (Ornitho) 7/05/2014 Valle dell' Olona, osservato ad. che trasporta cibo durante il periodo di nidificazione (M.Tomasi). - (Guenzani & Saporetto, 1988) nella ricerca 1983/1987 risulta l' ultima nidificazione certa a Cislago nel 1985.	F	2014
310	Cornacchia grigia <i>Corvus cornix</i>	S B M W	Molto freq.	- In espansione come sedentaria sul territorio provinciale, ai residenti durante l' anno si aggiungono anche individui in migrazione.	C	2017
311	Corvo imperiale <i>Corvus corax</i>	S B	Freq.	- Possibili spostamenti della specie anche ad ampio raggio.	C	2017
<b>PASSERIFORMES STURNIDAE</b>						
312	Storno <i>Sturnus vulgaris</i>	S B M W	Molto freq.		C	2017
313	Storno roseo <i>Sturnus roseus</i>	Ast3	Stor.	- (Moltoni E., 1969) mag. 1968 1 ind. preso vivo a Ispra, 22/12/1964 1 ind. f. catturato nei dintorni di Varese. - (Bianchi et al. 1973) definito accidentale, 1959 1 ind. catturato in Val Marchirolo dal sig. Borri Rino.		
<b>PASSERIFORMES PASSERIDAE</b>						
314	Passera europea <i>Passer domesticus</i>	S? M	Rara	- Poche le segnalazioni provinciali conosciute, alcune attribuite alla specie <i>Passer domesticus</i> sono molto probabilmente da considerare come ibridi <i>domesticus x italiae</i> . Di contro, qualche segnalazione di ibrido <i>domesticus x italiae</i> potrebbe invece essere riconducibile alla specie <i>Passer domesticus</i> . Non si possono inoltre escludere fenomeni di erratismo o di inizio di espansione territoriale da parte di qualche individuo proveniente da popolazioni stanziali situate a Nord delle Alpi. In attesa di ulteriori verifiche e approfondimenti viene riportata solo l'ultima segnalazione conosciuta: (Ornitho) 10/10/2016 1 ind. m. Germignaga (A.Corso).		
315	Passera d'Italia <i>Passer italiae</i>	S B	Molto freq.		C	2017
316	Passera mattugia <i>Passer montanus</i>	S B M W	Freq.	- Specie essenzialmente sedentaria e solo parzialmente migratrice.	C	2017
317	Passera lagia <i>Petronia petronia</i>	Ast1	Stor.	- Sedentaria e nidificante sulle Alpi occidentali. Le poche osservazioni provinciali del secolo scorso si riferiscono probabilmente a fenomeni di erratismo. - (Bianchi et al. 1973) definita rarissima di passo, 17/11/1963 2 indd. catturati nel roccolo Ranchet di Besnate - Gallarate. Presente anche segnalazione non meglio documentata di 2 indd. trovati a Busto Arsizio in un negozio di cacciagione nel nov. 1963.		
318	Fringuello alpino <i>Montifringilla nivalis</i>	A2 (1)	Molto rara	- Specie sedentaria nidificante sulle Alpi e migratore irregolare. Le poche osservazioni provinciali si riferiscono probabilmente a migratori invernali o a fenomeni di erratismo. - (Ornitho) 28/12/2017 1 ind. Sasso Galletto Castelveccana (L.Giussani). - (Bianchi et al. 1973) definito rarissimo, invernale. 12-13 gen. 1963 4 indd. osservati in loc. Bocchette del Cuvignone (mt 1000) (Martinoli). Altre segnalazioni non documentate anni: 1946,1945.		

Nr	<p>LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p>Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>		<p>Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p>Freq. oss.</p>	<p>NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p>NID. GR.</p>	<p>NID. Ult. anno nidif. certa</p>
		<p>PASSERIFORMES      ESTRILDIDAE</p>					
319	Bengalino comune	<i>Amandava amandava</i>	M? Int	Rara	<p>- Specie introdotta o fuggita alla cattività. Ultimamente alcuni individui si sono naturalizzati al di fuori dei confini provinciali, anche se non sembra in province limitrofe. L'unica segnalazione provinciale conosciuta è riconducibile quasi certamente ad un individuo a fugo. - (Ornitho) 20/10/2002 1 ind. Palude Brabbia (L.Colombo).</p>		
		<p>PASSERIFORMES      FRINGILLIDAE</p>					
320	Fringuello	<i>Fringilla coelebs</i>	S B M W	Molto freq.	<p>- Il numero più elevato di osservazioni è riscontrabile nel periodo invernale e durante la migrazione primaverile.</p>	C	2017
321	Peppola	<i>Fringilla montifringilla</i>	M W	Freq.	<p>- Specie normalmente presente in inverno con punte massime nei mesi di novembre dicembre e gennaio, di solito a quote inferiori ai 500 mt in gruppi costituiti anche da diverse decine di individui. - (Ornitho) interessante concentrazione riscontrata il 7/11/2015 ca 450 indd. Biandronno (M.Carabella, F.Pianezza).</p>		
322	Verzellino	<i>Serinus serinus</i>	M W S B	Freq.	<p>- Specie essenzialmente migratrice, non si esclude qualche raro individuo sedentario.</p>	C	2017
323	Verdone	<i>Carduelis chloris</i>	S B M W	Freq.		C	2017
324	Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>	S B M W	Freq.	<p>- La stagione estiva risulta essere il periodo di minor presenza della specie nel territorio provinciale.</p>	C	2017
325	Venturone alpino	<i>Carduelis citrinella</i>	M W Bst	Rara	<p>- La quasi totalità delle osservazioni è relativa alla parte montana della provincia, in particolare Veddasca. ●Note nidificazione: - (Realini 1978) anno 1978 stimata mezza dozzina di coppie nidificanti in Forcora Val Veddasca (C.Croci).</p>	B	1978
326	Lucherino	<i>Carduelis spinus</i>	M W Bst	Freq.	<p>- La quasi totalità delle osservazioni è relativa ai mesi autunnali e invernali. ●Note nidificazione: - (Realini 1978) segnala qualche rara coppia nidificante sul Campo dei Fiori e in Forcora.</p>	B	1978
327	Fanello	<i>Carduelis cannabina</i>	M W Bst	Poco freq.	<p>- Osservazioni nel periodo invernale e durante la migrazione primaverile e autunnale, quasi totalmente assenti nel periodo estivo. ●Note nidificazione: - (Realini 1978) 19/06/1978 nido con piccoli in Forcora (Veddasca). Sempre in Forcora nel 1978 stimate 3 coppie nidificanti.</p>	B	1978

Nr	<p style="text-align: center;">LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p style="text-align: center;">Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>	<p style="text-align: center;">Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p style="text-align: center;">Freq. oss.</p>	<p style="text-align: center;">NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">NID. GR.</p>	<p style="text-align: center;">NID. Ult. anno nidif. certa</p>
328	Organetto <i>Carduelis flammea</i>	M Wrr Bst	Rara	<p>Il nome scientifico è quello attribuito in (Fracasso et al.,2009), dove la specie non risulta ancora separata.</p> <p>- Probabile provenienza dall'area alpina, dove la ssp cabaret e' sedentaria e nidificante, o individui in migrazione verso l'areale di svernamento.</p> <p>Dove non indicato le segnalazioni si riferiscono alla ssp cabaret</p> <p>- (Ornitho) 19/12/2017 1 ind. Cadrezzate (L.Giussani), 26/11/2013 2 indd. Varese (S.Baratelli), 2/02/2003 1 ind. Ternate (L.Giussani).</p> <p>- (Ornitho) 1/03/2009 1 ind. ssp. flammea Brebbia (A.Boto).</p> <p>- (Realini 1978) 1978 alcune coppie segnalate in Forcora (Veddasca).</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) definisce la specie: di passo, molto rara la ssp nominale flammea e scarsa di passo e probabilmente invernale la ssp cabaret. Segnalazioni relative a diversi individui anni : 1965, 1946, 1945.</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>- (Realini 1978) 1978, nido con piccoli di una settimana in Forcora (Veddasca). Sempre nel 1978 in Forcora stimate 5 coppie nidificanti.</p>	B	1978
329	Crociere fasciato <i>Loxia leucoptera</i>	Ast1	Stor.	<p>- (Bianchi et al. 1973) definito di passo irregolare, molto raro. Il giorno 8 o 10 sett. 1963 4 indd. catturati presso il roccolo Ranchet di Besnate (Gallarate).</p>		
330	Crociere <i>Loxia curvirostra</i>	M Wrr S? Bst	Poco freq.	<p>- Specie essenzialmente migratrice, non si esclude la localizzata presenza di qualche individuo sedentario.</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>- (Guenzani &amp; Saporetto, 1988) nella ricerca 1983/1987 unica segnalazione di nidificazione certa a Montegrino Valtravaglia.</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) "la nidificazione avviene regolarmente su tutti i rilievi del Luinese".</p>	B	1987
331	Ciuffolotto scarlatto <i>Carpodacus erythrinus</i>	A1 (1)	Molto rara	<p>- (Gustin M., 2015) 22/08/2014 1 ind. inanellato Palude Brabbia.</p>		
332	Ciuffolotto <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	M W S? B? Bst	Poco freq.	<p>- Non si esclude qualche individuo sedentario in particolare nella parte centro-settentrionale della provincia.</p> <p>- (Ornitho) dalla fine di novembre a tutto dicembre 2017 una decina di segnalazioni della ssp nominale <i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i> Ciuffolotto trombettiere (oss.vari).</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>- (Guenzani &amp; Saporetto, 1988) nella ricerca 1983/1987 nidificazione certa in 3 tavolette IGM 1:25.000 della parte settentrionale della provincia.</p> <p>- (Bianchi et al. 1973) definisce la specie come regolarmente nidificante sui rilievi prealpini ad altezze comprese tra i 600 e gli 800 mt di quota, sempre in ambiente di conifere.</p>	A	1987
333	Frosone <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	M W B	Freq.	<p>- Osservazioni nel periodo invernale e durante la migrazione primaverile e autunnale, scarse nel periodo estivo.</p> <p>●Note nidificazione:</p> <p>- (Casale 2015) nel periodo 2010-2014 in riferimento alla ricerca nel Parco Lombardo della Valle del Ticino, rilevata la presenza in periodo riproduttivo nei comuni di Sesto Calende, Lonate Pozzolo e Besnate.</p> <p>- (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 è stata censita una piccola popolazione nelle sezioni di Lavena Ponte Tresa, con un dato di nidificazione certa, e Valganna.</p>	C	2017

Nr	<p>LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p>Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>	<p>Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p>Freq. oss.</p>	<p>NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p>NID. GR.</p>	<p>NID. Ult. anno nidif. certa</p>
	PASSERIFORMES EMBERIZIDAE					
334	Zigolo delle nevi <i>Plectrophenax nivalis</i>	A5 (4)	Molto rara	- (Ornitho) 2/12/2017 1 ind. Monvallina Besozzo (L.Prada), 24/01/2015 1 ind. Lozza (S.Baratelli et al.), 20/11/2013 2 indd. Somma L. (S.Daverio), 16/12/2012 2 indd. Casorate S. (S.Daverio). - (Bianchi et al. 1973) definito rarissimo di passo e invernale. 2/12/1963 catturati 3 indd. presso Busto Arsizio (Castiglioni).		
335	Zigolo golarossa <i>Emberiza leucocephalos</i>	A1 (1)	Molto rara	- (Ornitho) dal 14/12/2004 al 19/12/2004 2-3 indd. Biandronno (L.Giussani).		
336	Zigolo giallo <i>Emberiza citrinella</i>	M W B	Poco freq.	●Note nidificazione: - (Guenzani & Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 nidificazione certa in 3 tavolette IGM 1:25.000. Due distinti areali riproduttivi, compresi a nord in Val Veddasca ed a sud nell'area di Gorla minore, Cislago, Gerenzano, e radure della pineta di Tradate.	F	2017
337	Zigolo nero <i>Emberiza cirius</i>	M Wirr	Rara	- (Ornitho) quasi tutte le osservazioni sono relative al periodo primaverile. - (EBN/BL) 13/04/2008 1 ind. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (A.Nicoli), 4/11/2007 1 ind. brughiera Arnetta Lonate Pozzolo (C.Dell'Acqua). - (M.Viganò rif.) Inverno 2005/2006, qualche individuo osservato a Germignaga. - (Bianchi et al. 1973) definito scarso di doppio passo e invernale.		
338	Zigolo muciatto <i>Emberiza cia</i>	M W S B	Freq.	- Specie essenzialmente migratrice ed erratica nel periodo invernale quando si sposta ad altitudini più basse, sedentaria solo parzialmente in particolare nella zona montana della provincia.	C	2017
339	Ortolano <i>Emberiza hortulana</i>	M Bst	Poco freq.	- (Ornitho) la quasi totalità delle osservazioni è relativa ai mesi di aprile e maggio. - (Vigorita et al. 2009) 2009, 1 ind. catturato nella stazione di inanellamento Cascina Meschio Varese. - (EBN/IT) 6/05/2006 3 indd. Germignaga (P.Casali et al.) - (EBN/BL) 10/09/2005 1 ind. Germignaga (M.Viganò). - (F.Casale rif.) 25/04/1980 1 ind. Somma Lombardo. - (Bianchi et al. 1973) definito estivo, comune in un habitat ristretto. ●Note nidificazione: - (Guenzani & Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 rilevata una popolazione nidificante di 12/18 coppie a Gorla minore, Cislago, Lonate Pozzolo. - (Bianchi et al. 1973) segnalato come nidificante ma in diminuzione su molti monti del Varesotto.	B	1987
340	Zigolo minore <i>Emberiza pusilla</i>	A3 (1)	Molto rara	- (EBN/an2004) 15/02/2004 1 ind. Lonate Pozzolo (C.Dell'Acqua, A.Turri). - (W. Guenzani rif.) primavera 2000, 1 ind. osservato loc. Schiranna Lago di Varese. - (Casale 2015) 9/04/2000 1 ind. Vizzola Ticino (F.Casale, C.Cavallaro) - (Bianchi et al. 1973) definito molto scarso di passo autunnale. Più volte trovati presso uccellatori individui che si presume catturati in zona. Il Ghidini lo definisce di passo quasi regolare nella regione dei laghi (Avicola. XI, pag. 32, 111/112; RIO, 1912, 36).		

LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017		Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.	Freq. oss.	NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE	NID. GR.	NID. Ult. anno nidif. certa
Nr	Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia					
341	Migliarino di palude <i>Emberiza schoeniclus</i>	M W B? Bst	Freq.	- Le principali osservazioni sono relative al periodo da ottobre a marzo, dalla seconda metà di aprile il numero diminuisce e sino a tutto il mese di settembre i pochi dati sono relativi a qualche individuo estivante e forse nidificante. ●Note nidificazione: - (Guenzani & Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987, una buona popolazione si riproduce in Palude Brabbia e coppie sparse occupano zone palustri minori, come la località Baraggia sul Bevera, la valle Bagnoli ed un' area a Mezzana superiore (Somma Lombardo). - (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie è stata censita con basse classi di frequenza nei laghi di Biandronno, di Varese, di Comabbio e nella Palude Brabbia. Solo in località Bruschera sul Lago Maggiore è stata riscontrata una frequenza maggiore. Nel periodo di ricerca solo dati di nidificazione probabile.	A	1987
342	Zigolo capinero <i>Emberiza melanocephala</i>	A1 (1)	Molto rara	- (Ornitho) 22/05/2011 1 ind. Lonate Pozzolo (S.Daverio).		
343	Strillozzo <i>Miliaria calandra</i>	M B	Rara	- Le poche osservazioni sono quasi tutte relative al periodo primaverile. ●Note nidificazione: - (Ornitho) 24/05/2011 segnalazione con cod. atlante di "nidificazione certa" relativa a 3 indd. di cui 2 juv. a Lonate Pozzolo (A.Vidolini). - (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie è risultata presente con una piccola popolazione localizzata nell'angolo Sud-Ovest della provincia e nelle residue brughiere di Lonate Pozzolo. Nel periodo di ricerca solo dati di nidificazione probabile. - (Guenzani & Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 un solo dato di nidificazione probabile: anno 1987 1 ind. in canto per alcuni mesi nel territorio di Daverio/Casale Litta. - (Bianchi et al. 1977) segnala che si fermerebbe a nidificare nelle brughiere e nei coltivi pianeggianti, senza indicare alcuna località o dato preciso.	F	2011

### SPECIE ESCLUSE - (anche se in passato considerate da alcuni autori)

Aquila di mare	<i>Haliaeetus albicilla</i>		Citata da (Bianchi et al. 1973) ma senza prove certe.
Berta maggiore	<i>Calonectris diomedea</i>		Citata da (Bianchi et al. 1973) ma senza prove certe.
Calandra	<i>Melanocorypha calandra</i>		Citata da (Bianchi et al. 1973) ma senza prove certe.
Fanello nordico	<i>Carduelis flavirostris</i>		Citata da (Bianchi et al. 1973) una cattura ma non certa.
Gallina prataiola	<i>Tetrax tetrax</i>		Citate da (Bianchi et al. 1973) alcune catture Lago Maggiore ma piana di Magadino (Svizzera).
Gambecchio frullino	<i>Limicola falcinellus</i>		Citata da (Bianchi et al. 1973) una sola cattura Lago Maggiore ma Arona (sponda piemontese).
Lanario	<i>Falco biarmicus</i>		Citata da (Bianchi et al. 1973) una sola cattura Lago Maggiore piana di Magadino (Svizzera)

Nr	<p>LISTA UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE al 31/12/2017</p> <p>Roberto Aletti Gruppo Insubrico di Ornitologia</p>	<p>Fenologia per B B? Bst vedi dati nidificaz.</p>	<p>Freq. oss.</p>	<p>NOTE OSSERVAZIONI - NIDIFICAZIONE</p>	<p>NID. GR.</p>	<p>NID. Ult. anno nidif. certa</p>
	<p>Marzaiola americana <i>Anas discors</i></p>			<p>Specie Nordamericana appartenente alle cat. A D1 E3 di possibile provenienza selvatica, rilasciata o sfuggita alla cattività, rara o accidentale allo stato naturale (Bacetti et al., 2014). A livello nazionale solo 4 segnalazioni accettate. Non inserita pur appartenendo "anche" a cat. A poichè l'unico dato provinciale è quasi certamente relativo ad un individuo di origine non selvatica. - (Ornitho) 19 e 21/04/2017 1 ind. m.ad. facilmente avvicinabile Lago Varese e Palude Brabbia (G.Zanetti, A.Viganò et al.)</p>		
	<p>Oca Lombardella minore <i>Anser erythropus</i></p>			<p>Citata da (Bianchi et al. 1973) una unica osservazione Lago Maggiore ma Locarno (Svizzera).</p>		
	<p>Picchio tridattilo <i>Picooides tridactylus</i></p>			<p>Citata una segnalazione da (Brichetti P.,1988 - Garavaglia R. &amp; Coll.,2000) ma non reperiti riscontri certi.</p>		
	<p>Sterpazzola della Sardegna <i>Sylvia conspicillata</i></p>			<p>Citata da (Bianchi et al. 1973) e (Brichetti P.,1988 - Garavaglia R. &amp; Coll.,2000) una osservazione relativa al 27/09/1945 Lago Maggiore ma Piana di Magadino Canton Ticino (Svizzera)</p>		
	<p>Storno nero <i>Sturnus unicolor</i></p>			<p>Citata da (Bianchi et al. 1973) e (Brichetti P.,1988 - Garavaglia R. &amp; Coll.,2000) una cattura di un ind. m. il 19/11/1933 Lago Maggiore ma Piana di Magadino Canton Ticino (Svizzera).</p>		
	<p>Tordo golanera <i>Turdus atrogularis</i></p>			<p>Citata da (Bianchi et al. 1973) un individuo conservato al Seminario di Gorla, provenienza probabile dintorni Seminario ma non certa.</p>		
	<p>Zigolo boschereccio <i>Emberiza rustica</i></p>			<p>Citata da (Bianchi et al. 1973) ma senza prove certe .</p>		
	<p>Zigolo della Lapponia <i>Calcarius lapponicus</i></p>			<p>Citata da (Bianchi et al. 1973) una cattura sopra Lago Maggiore ma provincia di Novara.</p>		